



Fokbeheer

Kode-Nr. 99-94-0495 NL

Uitgave: 07/2018

1	Systeembeschrijving	1
1.1	Systeembeperkingen	1
2	Voercurve	2
2.1	Voedingsstoffen aanmaken	2
2.2	Componenten aanmaken	3
2.3	Recept aanmaken	7
2.4	Voormengrecept aanmaken	10
2.5	Voercurve voor droogvoeren definiëren	13
2.6	Voercurve voor vloeibaar voeren definiëren	19
3	Dierbewegingen	26
3.1	Ingekomen	26
3.2	Verwijderd	29
3.3	Verplaatsen	31
4	Slachtvarkens beheren	32
4.1	Filterfuncties	33
4.1.1	Filter Locatie	33
4.1.2	Snelfilter	34
4.1.3	Filterresultaat	35
4.1.4	Overzicht instellen	36
4.2	Populatieboek	37
4.2.1	Algemene diergegevens wijzigen	41
4.2.2	Instelling van het voeren bewerken	43
4.2.3	Activiteiten bewerken	45
4.2.4	Diergroepen meervoudige bewerking	46
4.2.5	Behandeling verrichten	48
4.3	Voerboek	53
4.4	Behandelingenboek	54
4.5	Dierbewegingen	55
4.5.1	Dierverplaatsingen bewerken/verwijderen	55
4.6	Voerbeoordeling	56
4.7	Stamevaluatie	56
4.8	Trogbewaking	59
4.9	Gegevensexport	60
5	Stamgegevens	62
5.1	Ras aanmaken	63
5.2	Leveranciers toevoegen	63
5.3	Instellingen voor levering en verbruik	64

5.4	Voederfase aanmaken	65
5.5	Vreettijdtabel aanmaken	66
Index		68

Auteursrecht

De software is eigendom van Big Dutchman International GmbH en auteursrechtelijk beschermd. Deze mag niet naar andere dragers worden gekopieerd of worden vermenigvuldigd, tenzij dat in de licentieovereenkomst of het koopcontract uitdrukkelijk wordt vermeld.

De gebruiksaanwijzing of delen daaruit mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd (resp. anderszins gereproduceerd) of vermenigvuldigd. Het is ook niet toegestaan om de hier beschreven producten en de bijbehorende informatie onrechtmatig te gebruiken of derden daarvan in kennis te stellen.

Big Dutchman behoudt zich het recht voor om wijziging aan producten en deze gebruiksaanwijzing aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen niet garanderen dat u kennisgevingen over wijzigingen aan uw producten of handleidingen zult ontvangen.

© Auteursrechten 2014 Big Dutchman

Aansprakelijkheid

De fabrikant of leverancier van de hier beschreven hardware en software is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei schade (zoals dood of ziekte van dieren of andere winstdervingen) die door storingen of onjuiste toepassingen resp. bediening zou kunnen ontstaan.

Er wordt voortdurend gewerkt aan de doorontwikkeling van computers en programma's; ook gebruikerswensen worden daarbij in acht genomen. Indien u ook wijzigings- of verbeteringsvoorstellen heeft, doet u ons een plezier deze aan ons mee te delen.

Big Dutchman International GmbH

BU Pig


P.O. Box 1163

49360 Vechta

Germany

Tel.: +49(0)4447/-801-0 Fax: +49(0)4447-801-237 e-mail: big@bigdutchman.de

1 Systeembeschrijving



Afbeelding 1-1: Symbool voor het fokbeheer

BigFarmNet Fokbeheer is een database, waarmee u uw volledige veebestand aan fokdieren en hun voersysteem kunt beheren. U maakt een omvangrijke gegevensverzameling aan die u voor verschillende doeleinden kunt oproepen. BigFarmNet fokbeheer biedt u de volgende functies:

- Overzicht van het gehele veebestand en hun voersysteem
- Overzicht van het voerverbruik
- Gezondheidsstatus controleren
- Dierbewegingen (in-, om- en uitstalprocessen) controleren
- Groeistadia controleren
- Voercurven definiëren en toewijzen
- Voersysteem aanpassen
- Diergroepen met bepaalde kenmerken filteren
- Stamgegevens aanmaken en bewerken
- Populatiegegevens afdrukken of exporteren

1.1 Systeembeperkingen

100000	Vee
50	Voercurven
1000	Componenten
50	Recepten

2 Voercurve

Het definiëren van de voercurven behoort tot de basisinstelling die bij de ingebruikname naast het stallen wordt uitgevoerd. Voor een benodigde voeding definieert u middels een voercurve, welke voercomponenten, met welke aandelen, in welke periode moeten worden gevoerd. Zo worden voercurven automatisch aangepast aan de verschillende behoeften van afzonderlijke groeistadia resp. productiecycli. Tijdens de productie wordt de werkelijke status van de voeding geregistreerd en aan de hand van de vooraf ingevoerde voercurves gecontroleerd.


LET OP!

De voercurve wordt altijd vóór het stallen gedefinieerd, omdat deze bij het stallen een verplichte invoer is. Voordat u echter een voercurve definieert, moet u eerst (voer-)componenten en naar wens of type voeding extra voedingsstoffen, voormengrecepten en recepten aanmaken.


2.1 Voedingsstoffen aanmaken

Tot de voedingsstoffen behoren koolhydraten, vetten, proteïne maar ook vitamines en mineralen. Met de aangemaakte voedingsstoffen bepaalt u de voedingswaarde van uw componenten. Als u een component aanmaakt, worden alle reeds aangemaakte voedingsstoffen weergegeven. U kunt dan per component de bijbehorende waarde invoeren, zie hoofdstuk 2.2 "Componenten aanmaken".


1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Voedingsstoffen".



2. Klik in het dialoogvenster "Voedingsstoffen" op "Bewerken".
3. Geef de voedingsstof een naam en leg de eenheid vast.



4. Optioneel kunt u voor elke voedingsstof de prioriteit vastleggen. De voedingsstoffen kunt u later op prioriteit aflopend naar onder of boven sorteren.




5. Bevestig de invoer door te klikken op "OK".

2.2 Componenten aanmaken

In het dialoogvenster "Componenten" definieert u verschillende componenten en de bijbehorende informatie. Componenten worden aan de categorieën "Voeren" en "Additief" toegewezen. Een component van de categorie "Voeren" kan een afzonderlijk bestanddeel van het voer of een compleet voer zijn.

1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Componenten".



2. Klik in het dialoogvenster "Componenten" op "Toevoegen".

3. Wijs een naam aan de componenten toe en kies een categorie uit.

4. Definieer onder het eerste tabblad "Voedingswaarde" het aandeel droge stof van de componenten.

	Naam	VM	DS 88%	DS 100%
+	Energie	0,0	MJ/kg	
~	Calcium	0,0	g/kg	

5. Pas als u het aandeel droge stof hebt ingevoerd, kunt u tussen de volgende hoeveelheden kiezen:
- VM = per verse massa
 - DS 88 % = op basis van 88 % droge stof
 - DS 100 % = op basis van 100 % droge stof

Voer zo nodig in de hieronder aangegeven tabel de waarden voor de energiewaarde en het aandeel voor de voedingsstoffen in (zie 2.1 "Voedingsstoffen aanmaken").

	Naam	VM	DS 88%	DS 100%
+	Energie	12,6	MJ/kg	
~	Calcium	10,0	g/kg	
~	Vitamine E	15,0	ppm	
~	Vitamine A	0,0	ppm	
~	Vitamine H	0,0	ppb	

6. Definieer onder het tabblad "Technische instellingen" de parameters voor de voorbereiding in de mixtank.

Component - Toevoegen

Naam: Component 1

Categorie: Voeren

Voedingswaarde | **Technische instellingen** | Vervangingscomponenten | Instellingen vloeibaar voer | Culina setti

Mengen

Totale mengtijd: 00:00:00 hh:mm:ss

☐ Mengen met interval

Interval mengtijd: 00:00:00 hh:mm:ss

Interval pauzetijd: 00:00:00 hh:mm:ss

Lage mengsnelheid: ☐

Dosereren

Grenswaarde tijddoseren: 0,0 kg ☐ Automatisch

Doseertype: op gewicht ☒ Handbediening

Specifiek gewicht

Specifiek gewicht: 1,000 kg/l

OK Annuleren

- Leg onder **Totale mixtijd** een tijdsperiode voor het mengen van de componenten vast. Als er meerdere componenten met elkaar worden vermengd, dan wordt volgens het component met de langste mengtijd gemengd.
- Als een component moet uitzetten, klikt u op **Mengen met interval** en voert u de overeenkomstige waarde in.
- Definieer de instelling voor het doseren van de componenten:
 - > **Automatisch:** Definieer een gewicht als drempelwaarde. Dat betekent dat als het gewicht van het gedoseerde component onder de drempelwaarde ligt, dan wordt er automatisch op tijd gedoseerd. Als het gewicht boven de drempelwaarde ligt, wordt er automatisch op gewicht gedoseerd.
 - OF
 - > **Handbediening:** U legt vast of er in het algemeen "op gewicht" of "op tijd" wordt gedoseerd.
- Als het component in water is opgelost, wijzigt u indien nodig de voorinstelling onder **Specifiek gewicht**.

7. Selecteer onder het tabblad "Vervangingscomponenten" een of meerdere vervangingscomponenten voor als uw aangemaakte componenten voor de bestelling is opgebruikt. U kunt meerdere vervangingscomponenten op prioriteit aflopend sorteren.

The screenshot shows the 'Component - Toevoegen' window with the 'Vervangingscomponenten' tab selected. The 'Naam' field is 'Component 1' and the 'Categorie' is 'Voeren'. The 'Vervangingscomponenten' section shows a list of components on the left and a selection area on the right. The list includes 'Bigvoeding 13,0 MJ EM' (highlighted), 'Bigvoeding 13,4 MJ VM', 'Bigvoeding 13,6 MJ', 'Bigvoeding 13,6 MJ CORONA', 'Bigvoeding 14,0 MJ', 'Bigvoeding 14,2 MJ', and 'Gebruikt water'. The right side is labeled 'Voor Component 1' and has up/down arrows.

8. Definieer onder het tabblad "Instellingen vloeibaar voer" de benodigde instellingen.

The screenshot shows the 'Component - Toevoegen' window with the 'Instellingen vloeibaar voer' tab selected. The 'Naam' field is 'Component 1' and the 'Categorie' is 'Voeren'. The 'Technische instellingen vloeibaar voer' section contains the following settings:

- Wachten na roerwerk mixtank aan/uit: 3,0 s
- Doseren met roerwerk van mixtank: ☒
- Component door circuit doseren: ☐
- Geprefereerd type voerpomp: None
- Parameters voor gebruik als additief:
 - Positie voor doseren in de mixtank voor activiteiten: Na aanpassingscomponenten
 - Start Medinject voor stomp of kleppen voor het doseren in de mixtank: ☐
 - Hoe moeten ontbrekende ingrediënten voor activiteiten worden behandeld: Alarm
- Parameters voor doseren in mixtank:
 - Vorbereidingstemperatuur tijdens doseren in mixtank: 0,0 °C
 - Toegestane temperatuurtolerantie (±): 3,0 °C
 - Extra meentijd na doseren: 00:00:00 hh:mm:ss


At the bottom are 'OK' and 'Annuleren' buttons.

- **Component door circuit doseren** betreft water of wei, dat met een bepaalde pomp (**Geprefereerd type voerpomp**) door het circuit gedoseerd moet worden.

- Instellingen in het onderste gedeelte **Parameters voor doseren in mixtank** moeten voor de applicatie CulinaMixpro worden gedefinieerd:

De te definiëren temperatuurwaarden zijn streefwaarden. De parameter **Extra mengtijd na doseren** dient ertoe zodat het component bij de aangegeven temperatuur kan oplossen.

9. Definieer onder het tabblad "Kleur" een kleur voor het component. U kunt de componenten later in de voercurve en bij de evaluatie beter herkennen en beter onderscheiden van de overige componenten.




10. Als u alle instellingen hebt uitgevoerd, klikt u op "OK".

2.3 Recept aanmaken

In het dialoogvenster "Recepten" stelt u uit de aangemaakte componenten (zie 2.2 "Componenten aanmaken") een recept voor een voermix samen. Een recept wordt bij het aanmaken van een voercurve als een component behandeld.

1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Recepten".




2. Klik in het dialoogvenster "Recepten" op "Toevoegen".
3. Geef een naam aan het recept.

4. Voeg onder het eerste tabblad "Basisvoer" de gewenste bestanddelen voer, additief of medicijn toe.



5. Kies de invoer tussen verse massa (VM) of droge stof (DS) en definieer het desbetreffende aandeel bestanddelen.


De aandelen moeten in totaal 100 % geven. De verdeling wordt in een diagram weergegeven.



OF:

U kunt een automatische verdeling uitvoeren:

- a) Klik op "Oprekken":




- b) Deactiveer indien nodig bestanddelen, waarvan het vastgelegde aandeel bij de automatische verdeling **niet** gewijzigd dient te worden.

De automatische verdeling gaat uit van 100 %. Als een bestanddeel met een aandeel van bijv. 30 % wordt gedeactiveerd. Dan worden de andere bestanddelen gelijkmatig over 70 % verdeeld.



- c) Klik op "OK" en de bestanddelen worden automatisch verdeeld.
6. Onder het tabblad "Aanpassing" kunt u bestanddelen toevoegen die aanvullend evenredig met een aandeel water moeten worden gebruikt.


De aandelen inhoudsstoffen evenals het aandeel droge stof worden telkens in een diagram weergegeven.



7. U kunt als volgt het aandeel droge stof direct in het schema wijzigen:
- Klik op het desbetreffende punt in het schema en houdt de muisknop ingedrukt.
 - Beweeg het punt omhoog of omlaag om het aandeel droge stof te verminderen resp. te vergroten.
8. Klik op het tabblad "Totaal voer" en u ziet vervolgens een grafisch totaal voerbeeld van uw voermix.

Hier kunt u geen instellingen doorvoeren.

9. In het onderste bereik van het venster "Recept" hebt u onder de overige tabbladen de volgende instellopties:
- **Voedingswaarde:** Hier kunt u selecteren tussen de weergave VM, DS 88% en DS 100%. De energiewaarde en het aandeel voedingsstoffen worden dan met overeenkomstige waarden weergegeven.
 - **Technische instellingen:** Optie voor het wijzigen van het specifieke gewicht.
 - **Kleur:** Selecteer een kleur voor uw aangemaakte recept, zodat u het recept later eenvoudiger kunt terugvinden in de voercurve en bij de evaluatie en beter kunt onderscheiden van de overige componenten.




10. Als u alle instellingen hebt uitgevoerd, klikt u op "OK".


2.4 Voormengrecept aanmaken

Een voormengrecept definieert een mengsel, dat in de voormenger wordt gemaakt. Een voormengrecept bestaat uit aangemaakte componenten van zowel de categorie "Voeren" en / of "Additief" (vitamines, mineralen). Bij zeer kleine hoeveelheden is het wegen in de hoofdmenger niet mogelijk en wordt een voormenger voor kleine hoeveelheden gebruikt. Een voormengrecept wordt bij de voeding als een component behandeld.

1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Voormengrecepten".




2. Klik in het dialoogvenster "Voormengrecepten" op "Toevoegen".
3. Geef het voormengrecept een naam.
4. Voeg onder het eerste tabblad "Basisvoer" de gewenste bestanddelen voor voeren of additief toe.



5. Kies de invoer tussen verse massa (VM) of droge stof (DS) en definieer het desbetreffende aandeel bestanddelen.


De aandelen moeten in totaal 100 % geven. De verdeling wordt in een diagram weergegeven.



OF:


U kunt een automatische verdeling uitvoeren:

- a) Klik op "Oprekken":




- b) Deactiveer indien nodig bestanddelen, waarvan het vastgelegde aandeel bij de automatische verdeling **niet** gewijzigd dient te worden.

De automatische verdeling gaat uit van 100 %. Als een bestanddeel met een aandeel van bijv. 30 % wordt gedeactiveerd. Dan worden de andere bestanddelen gelijkmatig over 70 % verdeeld.



- c) Klik op "OK" en de bestanddelen worden automatisch verdeeld.
6. U kunt als volgt het aandeel droge stof direct in het schema wijzigen:
- Klik op het desbetreffende punt in het schema en houdt de muisknop ingedrukt.
 - Beweeg het punt omhoog of omlaag om het aandeel droge stof te verminderen resp. te vergroten.



7. Klik op het tabblad "Totaal voer" en u ziet vervolgens een grafisch overzicht van uw mengsel.

Hier kunt u geen instellingen doorvoeren.


8. Breng in het onderste gedeelte van het venster onder de desbetreffende tabbladen de overige instellingen aan.

Omdat een voormengrecept als een component wordt behandeld, zijn dit dezelfde instellingsopties, zie hoofdstuk 2.2 "Componenten aanmaken".

9. Als u alle instellingen hebt uitgevoerd, klikt u op "OK".

2.5 Voercurve voor droogvoeren definiëren


1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Vocercurven".



2. Klik in het volgende venster op "Toevoegen".

U kunt aangemaakte voercurves achteraf bewerken, kopiëren of verwijderen.

3. Selecteer in het volgende venster het overeenkomstige voercurvetype.



4. Selecteer vervolgens het eenheidstype en geef de voercurve een naam.

Hoofdoverzicht voercurve

Een nieuwe voercurve toevoegen

Voercurvetype: Mestdier - droogvoeren

Eenheidtype: **Verse massa**
Droge stof 88%
Droge massa 100%
Energie

Voercurvenaam:

> Volgende ✕ Annuleren

5. Klik op "Volgende".
6. Selecteer links uit de componentenlijst door te dubbelklikken of door een klik op de pijltoets de componenten voor uw voercurve.

De componentenlijst bevat alle aangemaakte voercomponenten, additieven, recepten en voormengrecepten.

Voercurve Type: Mestdier - droogvoeren Eenheidtype: Verse massa Naam: Verzorgingsperiode

Componentkeuze Envelopcurve Voersamenstelling Overzicht

Selecteer componenten

Type	Name	DM [g/kg]	Energie [MJ/kg]
Recept	Mix mesten	880,0	13,6
Voeren	Bigvoeding 13,0 MJ EM	880,0	13,0
	Bigvoeding 13,4 MJ VM	880,0	13,4
	Bigvoeding 13,6 MJ CORONA	880,0	13,6
	Bigvoeding 14,2 MJ	880,0	14,2
	Gerst	880,0	13,6
	Mais	880,0	13,6
	Rogge	880,0	13,6
	Soja	880,0	13,6
	Tarwe	880,0	13,6
	Triticale	880,0	13,6
	Zeugvoeding 12,6 MJ	880,0	12,6
	Zeugvoeding 13,4 MJ	880,0	13,4

Tot Voercurve 1

Type	Name	DM [g/kg]	Energie [MJ/kg]
Voeren	Bigvoeding 13,6 MJ	880,0	13,6
	Bigvoeding 14,0 MJ	880,0	14,0

7. Leg indien nodig de volgorde van de componenten vast.

Volgens de voorinstelling is de functie "Automatische mengvolgorde van de componenten" actief (knop is grijs weergegeven). Dit betekent dat het component met het grootste aandeel altijd eerst in de mixtank wordt getransporteerd. Als u op de knop klikt, deactiveert u deze functie en kunt u via de pijl omhoog en pijl omlaag de gewenste volgorde vastleggen.

Type: Mestdier - droogvoeren Eenheidtype: Verse massa Naam: Verzorgingsperiode

Overzicht

Tot Verzorgingsperiode

Type	Name	DM [g/kg]	Energie [MJ/kg]
Voeren	Bigvoeding 13,6 MJ	880,0	13,6
	Bigvoeding 14,0 MJ	880,0	14,0
	Bigvoeding 14,2 MJ	880,0	14,2

Automatische mengvolgorde van de componenten
Voor elke curvedag wordt het component met het grootste aandeel als eerste gemengd

8. Klik op "Volgende".
9. Definieer onder het tabblad "Envelopcurve" de voercurve:
 - a) Voer in de invoervelden onder de tabel de curvedag en de bijbehorende eenheden zoals het diergewicht en de voerhoeveelheid in.
 - b) Druk op de knop Enter, zodra u een curveperiode hebt aangemaakt.
 - c) Ga verder met de invoer van overige curvedagen.

Met elke verdere curvedag wordt de curve in het schema vorm gegeven.

Voercurve Type: Mestdier - droogvoeren Eenheidtype: Verse massa Naam: Verzorgingsperiode

Componentkeuze Envelopcurve Voersamenstelling Overzicht

Verse massa [g]

Diergewicht [kg] Energie [MJ] FM [g]

Dag	Diergewicht [kg]	Energie [MJ]	FM [g]
0	6,0	4,1	300
7	8,6	8,2	600
8	9,0	8,3	600
12	10,5	9,8	700
27	16,2	11,2	800
28	16,6	11,3	800
32	18,1	11,4	800
56	27,2	12,8	900

Opties

☐ Geen correctie

☒ Diergewicht

☐ Totale voering

☐ Gebruik voerfasen

☐ Gebruik beperkte hoeveelheid

Dag verwijderen

Volgende Annuleren

10. Selecteer rechtsonder in het deelvenster "Opties" de volgende voederingswijzen in:

- **Geen correctie** betekent dat de direct puur op de gedefinieerde curvedagen worden gevoerd, zonder rekening te houden met de gewichtsontwikkeling.
- **Diergewicht** betekent dat de dieren volgens hun gewichtsontwikkeling worden gevoerd. De dieren kunnen handmatig of via de sorteerweegschaal TriSort worden gewogen. Het door TriSort bepaalde gewicht wordt automatisch geregistreerd en kan in het logboek onder de parameter **Diergewicht** worden afgelezen. Als de dieren handmatig worden gewogen, moet u het bepaalde gewicht in het populatieboek onder **Gewicht curvedag** invoeren, zie hoofdstuk 4.2 "Populatieboek".
- **Totale voering** betekent dat voor een curveperiode een bepaalde totale voerhoeveelheid wordt vastgelegd, die gevoerd moet worden voordat er naar de volgende curvedag wordt overgeschakeld.

Bovendien kunt u de volgende functies activeren:

- **Gebruik voerfasen:** De afzonderlijke curvedagen kunnen aan voerfasen worden toegewezen. Voyerfasen maken het automatisch verwisselen op meer of minder voedertijden mogelijk.

Voor deze functie moet u de voedertijden eerst aan de voerfasen middels de criteriamanager  toewijzen.

- **Gebruik beperkte hoeveelheid:** Om overvreten van de dieren bij een sensorvoeding te voorkomen, kunt u deze functie activeren en de maximale hoeveelheid voer per curvedag begrenzen. Draag de waarde in de bijbehorende kolom in, die bij het activeren wordt weergegeven.

11. Klik op "Volgende" zodra u uw invoer hebt afgerond.

12. Definieer onder "Voersamenstelling" het procentuele aandeel van de afzonderlijke componenten voor een curveperiode. De opdeling gebeurt altijd uitgaande van 100 %.



- a) Klik op de gewenste curvedag in de lijst.

U kunt meerdere curvedagen in één keer bewerken: Houd de Ctrl-toets ingedrukt. Klik vervolgens alle curvedagen aan, die dezelfde procentuele verdeling dienen te hebben.

- b) Voer onder "Vaste ingrediëntenaandeel" het procentuele aandeel direct in het invoerveld in.

OF:

Gebruik de gekleurde lijn om de waarde te vergroten of te verkleinen: Klik daarvoor op de punt en houdt de muisknop ingedrukt. Beweeg de gekleurde lijn met behulp van de muis.

- c) Bij meer dan twee componenten kunt u het aandeel met een klik op het slotsymbool fixeren. Deze waarde wordt bij de definitie van andere aandelen niet meer gewijzigd.

DM 88% [g]	DM 100% [g]
300	264
600	528
600	528
700	616
800	704
800	704
800	704
900	792

Vaste ingrediëntenaandeel


Dag 56

100,0%

Bigvoeding 14,2 MJ

	FM	TS
0,0 %	0,0 %	0,0 %
25,0 %	25,0 %	25,0 %
75,0 %	75,0 %	75,0 %

13. Klik op "Volgende" en u gaat naar het tabblad "Overzicht".




Hier vindt u een samenvatting van de door u gemaakte voercurve. In het overzicht kunt u uw instellingen controleren, echter geen wijzigingen aanbrengen.

Als u op de afzonderlijke curvedag klikt, krijgt u in het venster "Aandeel" de overeenkomstige informatie te zien en onder het tabblad "Voedingswaarde" de ingestelde voedingswaarden te zien.

14. Klik vervolgens op "Opslaan" om alle instellingen op te slaan.

2.6 Voercurve voor vloeibaar voeren definiëren


1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Vocercurven".




2. Klik in het volgende venster op "Toevoegen".

U kunt aangemaakte voercurves achteraf bewerken, kopiëren of verwijderen.

3. Selecteer in het volgende venster het overeenkomstige voercurvetype.



4. Selecteer vervolgens het eenheidtype en geef de voercurve een naam.



5. Klik op "Volgende".
6. Selecteer linksboven uit de componentenlijst door te dubbelklikken of door te klikken op de rechter pijl de droge componenten voor uw voercurve.

Voercurve Type: Mestdier - vloeibaar voer Eenheidtype: Verse massa Naam: Voerkurve vloeibaar

Componentkeuze Envelopcurve Voersamenstelling Mengverhouding Overzicht

Selecteer componenten

Type	Name	DM [g/kg]	Energie [MJ/kg]
Recept	Mix mesten	880,0	13,6
Voeren	Bigvoeding 13,0 MJ EM	880,0	13,0
	Bigvoeding 13,6 MJ CORONA	880,0	13,6
	Bigvoeding 14,0 MJ	880,0	14,0
	Bigvoeding 14,2 MJ	880,0	14,2
	Gerst	880,0	13,6
	Mais	880,0	13,6
	Rogge	880,0	13,6
	Soja	880,0	13,6
	Tarwe	880,0	13,6
	Triticale	880,0	13,6

Tot Voerkurve vloeibaar

Type	Name	DM [g/kg]	Energie [MJ/kg]
Voeren	Bigvoeding 13,6 MJ	880,0	13,6
	Bigvoeding 13,4 MJ VM	880,0	13,4

7. Leg indien nodig de volgorde van de componenten vast.

Volgens de voorinstelling is de functie "Automatische mengvolgorde van de componenten" actief (knop is grijs weergegeven). Dit betekent dat het component met het grootste aandeel altijd eerst in de mixtank wordt getransporteerd. Als u op de knop klikt, deactiveert u deze functie en kunt u via de pijl omhoog en pijl omlaag de gewenste volgorde vastleggen.

Type: Mestdier - vloeibaar voer Eenheidtype: Verse massa Naam: Vloeibaar voer

Overzicht

Tot Vloeibaar voer

Type	Name	DM [g/kg]	Energie [MJ/kg]
Voeren	Bigvoeding 13,6 MJ CORONA	880,0	13,6
	Bigvoeding 13,4 MJ VM	880,0	13,4
	Bigvoeding 13,0 MJ EM	880,0	13,0

Automatische mengvolgorde van de componenten
Voor elke curvedag wordt het component met het grootste aandeel als eerste gemengd

8. Selecteer linksonder uit de componentenlijst door te dubbelklikken of door te klikken op de rechter pijl de aanpassingscomponenten.


9. Definieer zo nodig rechts de volgorde met behulp van de pijl omhoog resp. pijl omlaag.

10. Klik op "Volgende".

11. Definieer onder het tabblad "Envelopcurve" de voercurve:

- Voer in de invoervelden onder de tabel de curvedag en de bijbehorende eenheden zoals het diergewicht en de voerhoeveelheid in.
- Druk op de knop Enter, zodra u een curveperiode hebt aangemaakt.
- Ga verder met de invoer van overige curvedagen.

Met elke verdere curvedag wordt de curve in het schema vorm gegeven.



12. Selecteer rechtsonder in het deelvenster "Opties" de volgende voederingswijzen in:

- **Geen correctie** betekent dat de direct puur op de gedefinieerde curvedagen worden gevoerd, zonder rekening te houden met de gewichtsonwikkeling.
- **Diergewicht** betekent dat de dieren volgens hun gewichtsonwikkeling worden gevoerd. De dieren kunnen handmatig of via de sorteerweegschaal TriSort worden gewogen. Het door TriSort bepaalde gewicht wordt automatisch geregistreerd en kan in het logboek onder de parameter **Diergewicht** worden afgelezen. Als de dieren handmatig worden gewogen, moet u het bepaalde gewicht in het populatieboek onder **Gewicht curvedag** invoeren, zie hoofdstuk 4.2 "Populatieboek".
- **Totale voering** betekent dat voor een curveperiode een bepaalde totale voerhoeveelheid wordt vastgelegd, die gevoerd moet worden voordat er naar de volgende curvedag wordt overgeschakeld.

Bovendien kunt u de volgende functies activeren:

- **Gebruik voerfasen:** De afzonderlijke curvedagen kunnen aan voerfasen worden toegewezen. Voerfasen maken het automatisch verwisselen op meer of minder voedertijden mogelijk.


Voor deze functie moet u de voedertijden eerst aan de voerfasen middels de criteriamanager  toewijzen.

- **Gebruik beperkte hoeveelheid:** Om overvreten van de dieren bij een sensorvoeding te voorkomen, kunt u deze functie activeren en de maximale hoeveelheid voer per curvedag begrenzen. Draag de waarde in de bijbehorende kolom in, die bij het activeren wordt weergegeven.

- **Gebruik tabellen vreettijd:** Tabellen vreettijd worden bij een sensorvoeding (ad libitum) gebruikt. De sensor meet of de trog leeg is gevreten of niet. De sensor meet bovendien hoe snel de trog leeg is gevreten. Deze informatie wordt aan de BigFarmNet Manager doorgegeven. Via een tabel vreettijd kunt u dan voor de overeenkomstige vreettijden een voeraanpassing uitvoeren.

13. Klik op "Volgende" zodra u uw invoer hebt afgerond.

14. Definieer onder "Voersamenstelling" het procentuele aandeel van de afzonderlijke componenten voor een curveperiode. De opdeling gebeurt altijd uitgaande van 100 %.



a) Klik op de gewenste curvedag in de lijst.


U kunt meerdere curvedagen in één keer bewerken: Houd de Ctrl-toets ingedrukt. Klik vervolgens alle curvedagen aan, die dezelfde procentuele verdeling dienen te hebben.

b) Voer onder "Vaste ingrediëntenaandeel" het procentuele aandeel direct in het invoerveld in.

OF:

Gebruik de gekleurde lijn om de waarde te vergroten of te verkleinen: Klik daarvoor op de punt en houdt de muisknop ingedrukt. Beweeg de gekleurde lijn met behulp van de muis.

c) Bij meer dan twee componenten kunt u het aandeel met een klik op het slotsymbool fixeren. Deze waarde wordt bij de definitie van andere aandelen niet meer gewijzigd.




15. Definieer onder het tabblad "Mengverhouding" het percentage droge stof (voer) en het water voor de desbetreffende curveperiode:

a) Klik op de gewenste curvedag in de tabel.

U kunt meerdere curvedagen in één keer bewerken: Houd de Ctrl-toets ingedrukt. Klik vervolgens alle curvedagen aan, die dezelfde procentuele verdeling dienen te hebben.

b) Voer het minimale percentage droge stof (Min TS) in het invoerveld onder de overeenkomstige kolom in.

c) Voer indien nodig de dichtheid in het invoerveld onder de overeenkomstige kolom in.




d) Voer in het deelvenster "Droge massa" de waarde voor de droge massa of voor water in.

De andere waarde evenals de verhouding worden automatisch berekend.

Dichtheid [kg/l]	Percentage droge stof	
1,080	Droge massa	Water
1,080	1,00	: 4,56
1,080	0,88	: 3,89
1,080	180,0 g/kg	820,0 g/kg
1,080	<input type="range"/> 0 500 1000	
1,080 kg/l	Interpolatie	
Volgende Annuleren		

16. Klik op "Volgende" en u gaat naar het tabblad "Overzicht".



Hier vindt u een samenvatting van de door u gemaakte voercurve. In het overzicht kunt u uw instellingen controleren, echter geen wijzigingen aanbrengen.


Als u op de afzonderlijke curvedag klikt, krijgt u in het venster "Aandeel" de overeenkomstige informatie te zien en onder het tabblad "Voedingswaarde" de ingestelde voedingswaarden te zien.

17. Klik vervolgens op "Opslaan" om alle instellingen op te slaan.

3 Dierbewegingen

Dierbewegingen in het fokbeheer zijn het in-, om- en uitstallen van dieren evenals de aanduiding van dode dieren. Alle dierbewegingen worden onder het gelijknamige tabblad geregistreerd, zie hoofdstuk 4.5 "Dierbewegingen".


Locaties met en zonder dieren zijn hier in de boerderijstructuur als volgt gemarkeerd:



- Donkergrijs foksymbool:
Dieren bevinden zich nu in het gebied / in het hok.
- Lichtgrijs foksymbool:
Dieren bevonden zich in het gebied / in het hok en zijn om- of uitgesteld. Het gebied / het hok is nu leeg.
- Zonder foksymbool:
 1. Optie: Het gebied / het hok is leeg. Tot nog toe bevonden zich geen dieren in het gebied / in het hok.
 2. Optie: In het gebied heerst een gemengd bedrijf met zeugen en fokdieren (geldt niet voor hokken).

3.1 Ingekomen

1. Klik in het menu "Activiteit" > "Slachtvarkens" op "Ingekomen".



2. Definieer (minimaal) de volgende gegevens:
 - **Datum In stal plaatsen** wordt automatisch met de huidige datum ingevuld.
 - **Aantal dieren** kan een dier of een groep van dieren met dezelfde kenmerken zijn.
 - **Voercurve** moet voor het in de stal plaatsen zijn aangemaakt, zie hoofdstuk 2 "Voercurve".

- De **Curvedag** wordt automatisch bepaald op basis van de voedercurve, zodra u het **Totaal gewicht** van alle dieren of het afzonderlijke **Diergewicht** invoert. Zodra u de vetgedrukte verplichte velden hebt ingevoerd, wordt de **Locatie** vrijgegeven.
3. Selecteer onder **Locatie** de gewenste installatie uit de boerderijstructuur. Als u het aantal dieren over meerdere locaties wilt verdelen, kunt u meerdere locaties selecteren.

4. Bevestig de selectie met de Enter-toets of door met de muis op een willekeurige vrije plaats te klikken.
5. Bepaal of u de dieren gelijkmatig over de geselecteerde locaties wilt verdelen.

Het in te stallen aantal dieren wordt in de kolom "Count" (Telling) aangegeven.

Als u het aantal dieren anders over de locaties wilt verdelen, moet u de kolom "Count" (Telling) zelf invullen. U kunt achteraf andere locaties toevoegen of via de knop "Verwijderen" weer verwijderen.

Lok	Count	Huidige aantal dieren	Totale aantal	Feed Curve	Curvedag	Weight	Voedergroepnr	Basisaanpassing
Fokhuis biggen								
Fokgebied biggen 1								
Kooi 3-1-2	0	30	30	Verzorgingspe...	15	11,64 kg		100 %
Kooi 3-1-1		30	30	Verzorgingspe...	15	11,64 kg		100 %

- Klik vervolgens op "Opslaan" om de gegevens over te nemen en het stallen te beëindigen.

Als het systeem inconsistenties bij het instalproces registreert, krijgt u de volgende melding.

Warning

There are discrepancies in one or more rows of the table.
For detailed information, click "No" and check the warning icons that will appear in the first column after click.

- House 1
 - Section 1
 - Pen 1
 - Pen 2
 - Pen 3
 - Pen 4

The corresponding warning is displayed as soon as you move the cursor over the warning symbol. A so-called "tooltip" appears.
If you want to continue anyway click directly on yes. Your changes will be applied.

Yes No

- Als u de waarschuwing(en) wilt controleren, klikt u op "No" (Nee). Het Instaldialoogvenster blijft open en waarschuwingssymbolen duiden de desbetreffende locaties aan.

Als u gegevens zonder controle wilt overnemen, klikt u op "Yes" (Ja). Het proces wordt beëindigd en het Instaldialoogvenster wordt gesloten.

8. Beweeg de muiscursor over de waarschuwingssymbolen en de bijbehorende waarschuwing wordt weergegeven.

U krijgt waarschuwingen als u bijvoorbeeld:

- probeert om meer of minder dieren in te stallen, dan onder **Aantal dieren** is aangegeven.
- Dieren in een locatie instalt, waar zich al dieren bevinden. De kenmerken van de reeds aanwezige dieren kunnen afwijken van de in te stallen dieren. De instellingen van de nieuwe dieren worden op de aanwezige dieren overgedragen.
- geen dieren hebt toegewezen aan een locatie.

Locatie: Kooi 3-2-1; Kooi 3-2-2; Kooi 3-2-3; K...

	Hok	Count	Huidige aantal dieren	Totale aantal	Feed Curve	Curvedag	Weight	Voedergroepnr	Basisaanpassing
Fokhuis biggen									
Fokgebied biggen 2									
	Kooi 3-2-1	5	30	35	Verzorgingsp...	13	11,00 kg		100 %
	Kooi 3-2-2	6	30	36	Verzorgingsp...	13	11,00 kg		100 %
De locatie 'Fokhuis biggen - Fokgebied biggen 2 - Kooi 3-2-2' heeft al 30 dieren toegewezen gekregen. Als u dieren toevoegt aan deze groep, krijgen zij hetzelfde voer als de toegevoegde groep. U probeert '11' dieren in plaats van '10' in de stal te verplaatsen.									

Verwijderen Opslaan Annuleren

3.2 Verwijderd

1. Klik in het menu "Activiteit" > "Slachtvarkens" op "Verwijderd".



2. U hebt de volgende mogelijkheden voor de bewerking:
- In het dialoogvenster zijn vervolgens alle locaties gemarkeerd. Door te klikken op een locatie wordt de markering voor alle andere locaties opgeheven. U kunt de functie "Selecteer alle dieren" indien nodig altijd weer activeren.
 - U kunt ook een locatie markeren en één voor één bewerken, waarbij u de waarden rechtstreeks in de tabel kunt invoeren.



LET OP!


Als u een locatie hebt gemarkeerd, kunt u met de pijltoetsen van uw toetsenbord de markering omhoog of omlaag verplaatsen.

- U kunt ook meerdere locaties markeren en tegelijkertijd bewerken als u dieren met dezelfde kenmerken uit verschillende locaties wilt stallen. De waarden kunt u in het onderste bereik "Dierdetails" invoeren. Enkele parameters hebben in eerste instantie verschillende waarden.
- U kunt de gewenste locatie(s) voor het bewerken filteren, zodat alleen deze in de tabel worden weergegeven.
- U kunt locaties via de knop "Verwijderen" volledig verwijderen. Dat betekent dat deze locaties niet langer beschikbaar zijn voor uitstallen. Op deze manier kunt u voorkomen dat dieren vanuit bepaalde locaties worden uitgestald.
- U kunt de waarde oftewel voor uitgestalde dieren (**Verwijderd**) of voor achterblijvende dieren (**Remaining (Achterblijvend)**) invoeren. Het systeem berekend automatisch de andere waarde.

3. Klik vervolgens op "Opslaan" om de gegevens over te nemen en het uitstallen te beëindigen.

Andere opties om afzonderlijke diergroepen uit te stallen zie hoofdstuk 4.2.3 "Activiteiten bewerken".


3.3 Verplaatsen




1. Klik in het menu "Activiteit" > "Slachtvarkens" op "Verplaatsen".
Het dialoogvenster voor Verplaatsen wordt geopend.
 2. Markeer links onder "Source" (Bron) de locatie waaruit u het dier wilt verwijderen.
 3. Markeer rechts onder "Target" (Doel) de locatie waaraan u het dier wilt toevoegen.
 4. Voer onder **Move (Verplaatsen)** het gewenste aantal dieren in.
Het resterende aantal wordt automatisch berekend en de gegevens worden onder "Source" (Bron) overeenkomstig aangepast.
 5. Klik op de rechterpijl om het verplaatsen uit te voeren.
Het verplaatsen wordt in het onderste bereik van het venster weergegeven.
 6. Als u het verplaatsen ongedaan wilt maken, klikt u op de rode knop.
 7. Klik op "OK" om het verplaatsen te beëindigen.
- Andere opties om afzonderlijke diergroepen te verplaatsen zie hoofdstuk 4.2.3 "Activiteiten bewerken".

4 Slachtvarkens beheren

Het fokbeheer wordt via de themaselectie opgevraagd.



U kunt via de overeenkomstige tabbladen de volgende secties van het fokbeheer openen:



- Het **Populatieboek** biedt u een overzicht over het actuele veebestand en het voersysteem. In het populatieboek beheert u activiteiten zoals verplaatsen of medische behandelingen, zie hoofdstuk 4.2 "Populatieboek".
- Het **Voerboek** biedt u een gedetailleerd overzicht van alle voedertijden en voerhoeveelheden per voedertijd van uw diergroepen, zie hoofdstuk 4.3 "Voerboek".
- In het **Behandelingenboek** vindt u alle gegevens over de medische behandelingen van uw dieren. Bovendien krijgt u informatie over blokkeringsperioden, die na een medicatie tot aan de verkoop of het slachten van de dieren moeten worden afgewacht, zie hoofdstuk 4.4 "Behandelingenboek".
- Onder **Dierversplaatsingen** vindt u informatie over alle in-, om- en uitstalprocessen evenals over alle dode dieren, zie hoofdstuk 4.5 "Dierbewegingen".
- De **Voerbeoordeling** biedt u een overzicht over het vreetgedrag van uw dieren in de afgelopen 7 dagen, zie hoofdstuk 4.6 "Voerbeoordeling".
- In de **Stamevaluatie** kunt u de voerkosten met de gewichtstoename van uw dieren vergelijken en zo het succes van uw fokdieren controleren, zie hoofdstuk 4.7 "Stamevaluatie".
- De **Trogbewaking** geeft u informatie over de status van uw sensortroggen (leeg of niet leeg). Bovendien krijgt u informatie over de vreesnelheid, vreettijd evenals de laatste voeding conform de sensor, zie hoofdstuk 4.8 "Trogbewaking".

4.1 Filterfuncties

4.1.1 Filter Locatie

Als u in de boerderijstructuur de gewenste locatie (stal, afdeling of sectie) aanklikt, worden de dieren uit deze locatie in de tabel weergegeven.

BigFarmNet-manager

Manager Activiteit configuratie Set-up Help

Populatieboek Voerboek Behandelingenboek Dierversplaatsingen voerbeoordeling Stamevalu

Gebruik de selectie Onthoud selectie Selectie verwijderen Snelfilter

Locatie	Groepnr.	Aantal	Voercurve	Curvedag	Trend	Gewicht curvedag	Berek gewicht
Stal: Fokhuis							
Afdeling: Sectie 1							
Kooi 4-4-10	43	14	Afwerkingsperiode	38	↓	0,00 kg	
Kooi 4-4-3	43	14	Afwerkingsperiode	38	↓	0,00 kg	
Kooi 4-4-4	43	14	Afwerkingsperiode	38	↓	0,00 kg	
Kooi 4-4-6	43	14	Afwerkingsperiode	38	↓	0,00 kg	
Kooi 4-4-11	43	14	Afwerkingsperiode	38	↓	0,00 kg	
Kooi 4-4-7	43	14	Afwerkingsperiode	38	↓	0,00 kg	
Kooi 4-4-1	43	14	Afwerkingsperiode	38	↓	0,00 kg	
Kooi 4-4-5	43	14	Afwerkingsperiode	38	↓	0,00 kg	
Kooi 4-4-8	43	14	Afwerkingsperiode	38	↓	0,00 kg	
Kooi 4-4-2	43	14	Afwerkingsperiode	38	↓	0,00 kg	
Kooi 4-4-12	43	14	Afwerkingsperiode	38	↓	0,00 kg	
Kooi 4-4-9	43	14	Afwerkingsperiode	38	↓	0,00 kg	



LET OP!


Bij elke volgende filterinstelling worden alleen de dieren van de geselecteerde locatie weergegeven.

Klik in de boerderijstructuur op het stalniveau, als u uw volledige veebestand wilt zien.

4.1.2 Snelfilter

In alle gebieden, uitgezonderd de Stamevaluatie en de Trogbewaking, hebt u de functie van het snelfilter, waarmee u gericht bepaalde diergroepen kunt filteren.

1. Klik in de bovenste balk op de knop "Snelfilter" om het snelfilter te activeren.




In de tabel verschijnt een extra regel onder de kopregel.

2. Klik in de nieuwe regel in de cel van de gewenste parameter:

Locatie	Groepnr.	Aantal	Voercurve	Curvedag	Trend	Gewicht curvedag	Berekend gewicht	VM	Voerronde uitgevoerd	QE	
Stal: Fokhuis biggen											
Afdeling: Fokgebied biggen 1											
Kooi 3-1-4	20	30	Verzorgingsperiode	22	→	13,92 kg	13,54 kg	0,76 kg	50%	✓	
Kooi 3-1-3	20	30	Verzorgingsperiode	22	→	13,92 kg	13,54 kg	0,76 kg	50%	✓	
Kooi 3-1-2	20	30	Verzorgingsperiode	22	→	13,92 kg	13,54 kg	0,76 kg	50%	✓	
Kooi 3-1-1	20	30	Verzorgingsperiode	22	→	14,30 kg	13,54 kg	0,77 kg	50%	✓	
Kooi 3-1-5	20	30	Verzorgingsperiode	22	→	13,92 kg	13,54 kg	0,76 kg	50%	✓	
Kooi 3-1-6	20	30	Verzorgingsperiode	22	→	14,30 kg	13,54 kg	0,77 kg	0%	✓	
Afdeling: Fokgebied biggen 2											
Kooi 3-2-5	21	30	Verzorgingsperiode	27	→	15,82 kg	15,44 kg	0,79 kg	0%	✓	
Kooi 3-2-2	21	30	Verzorgingsperiode	27	→	16,20 kg	15,44 kg	0,80 kg	0%	✓	
Kooi 3-2-4	21	30	Verzorgingsperiode	27	→	15,82 kg	15,44 kg	0,79 kg	0%	✓	
Kooi 3-2-6	21	30	Verzorgingsperiode	27	→	15,82 kg	15,44 kg	0,79 kg	0%	✓	
Kooi 3-2-1	21	30	Verzorgingsperiode	27	→	16,20 kg	15,44 kg	0,80 kg	0%	✓	
Kooi 3-2-3	21	30	Verzorgingsperiode	27	→	15,82 kg	15,44 kg	0,79 kg	0%	✓	
Afdeling: Fokgebied biggen 3											

- Voer bij parameters met numerieke waarden, zoals "Groepnr." of "Curvedag" het gewenste getal.
- Maak bij parameters met opgeslagen gegevens, zoals "Voercurve" of "Klep" de gewenste selectie.



- Via de parameters "QE" en "QE-blokkering" kunt u de diergroepen filteren, die vanwege een medicatie tot aan de uitstalling aan een blokkeringsperiode zijn onderworpen.

Klik het selectievakje onder "QE" tot aan de gewenste weergave aan:

The screenshot shows a table with columns: Berekend gewicht, Dagelijkse hoeveelheid, Ontvangen voer, Voerronde uitgevoerd, QE, and QE-blokkering. The 'QE' column has a dropdown arrow. A hand icon is pointing to the dropdown arrow in the 'QE' column.

- ☒ Er worden alleen diergroepen **zonder blokkeringsperiode** weergegeven.
- ☐ **Alle** diergroepen worden weergegeven, onafhankelijk van een blokkeringsperiode.
- ☐ Er worden alleen diergroepen **met blokkeringsperiode** weergegeven.

Onder "QE-blokkering" kunt u het aantal dagen invoeren. Daarna worden de dieren weergegeven, die voor deze periode geblokkeerd zijn.

- Om het snelfilter te beëindigen, klikt u opnieuw op de knop "Snelfilter".

4.1.3 Filterresultaat

Na het filteren kunt u de gewenste selectie opslaan en later weer opvragen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld de ontwikkeling van een bepaalde diergroep tijdens de fok volgen. Opgeslagen selectievermeldingen kunt u ook weer verwijderen.

Deze functies vindt u in de bovenste balk via de knoppen

- Onthoud selectie
- Gebruik de selectie
- Selectie verwijderen

The screenshot shows the top navigation bar with buttons: Populatieboek, Voerboek, Behandelingenboek, Dierversplaatsingen, voerbeoordeling, and Stamevaluatie. Below these are buttons: Gebruik de selectie (with a dropdown arrow), Onthoud selectie, Selectie verwijderen, Snelfilter, and a checkbox labeled 'Vert'.

- Filter de gewenste diergroepen.

2. Markeer één of meerdere diergroepen.

Hulppositie voor meervoudige markering zie hoofdstuk 4.2.4 "Diergroepen meervoudige bewerking".

3. Klik op de knop "Onthoud selectie".

4. Voer in het volgende venster een naam in voor de selectie en klik op "OK".

5. Als u een opgeslagen selectievermelding wilt openen, klikt u op "Gebruik de selectie" en selecteert u de gewenste vermelding.

6. Als u een opgeslagen selectievermelding weer wilt verwijderen, klikt u op "Selectie verwijderen".

Voor het verwijderen moet de selectievermelding gemarkeerd zijn.


4.1.4 Overzicht instellen

U kunt het aanzicht in de tabel als volgt instellen:

- **Verberg groepen:**

De dieren in de tabel worden standaard op hun locatie gegroepeerd weergegeven.


Plaats indien nodig het vinkje bij "Verberg groepen" om de dieren in een doorlopende lijst weer te geven.



- **Kolommen weergeven en verbergen:**

a) Door rechts te klikken op de kopregel opent u het contextmenu met alle parameters.

b) Selecteer of deselecteer de parameters en de overeenkomstige kolommen worden weergegeven of verborgen.



- **Kolommen verschuiven:**

- Klik in de kopregel op de gewenste kolom en houdt de muisknop ingedrukt.
- Trek de kolom naar de gewenste positie.

De pijlen, die bij het verschuiven op de kopregel verschijnen, helpen u om de nieuwe positie toe te wijzen.




- Laat de muisknop los.

De kolom verschijnt op de gewenste positie.

- **Gegevens sorteren:**

Klik op de gewenste parameter in de kopregel en de dieren worden oplopend of aflopend volgens de overeenkomstige waarden gesorteerd.

4.2 Populatieboek



Het populatieboek biedt u een overzicht over het gehele veebestand en het voersysteem. Als u alleen bepaalde diergroepen ziet en/of wilt bewerken, gebruikt u vervolgens de filterfuncties zie hoofdstuk 4.1.


De waarden van parameters met een pensymbool  kunt u direct met een dubbelklik in de tabel wijzigen. De parameters zijn als volgt gedefinieerd:

- **Groepnr.:** Het groepnummer kan handmatig worden ingevoerd om de diergroepen te onderscheiden.
- **Aantal:** Het aantal dieren per hok.
- **Voercurve:** De voercurve waarmee in het hok wordt gevoerd.
- **Curvedag:** De curvedag, die actueel voor de dieren in het hok geldt.
- **Trend:** De trend toont het vreetgedrag van de dieren op basis van de voercurve.
 -  Dieren vragen minder voer.
 -  Vreetgedrag voldoet aan de voercurve.
 -  Dieren vragen meer voer.
- **Gewicht curvedag:** Het gewicht dat volgens de voercurve voor de betreffende curvedag is gedefinieerd.
- **Curvedag gewicht van groep:** Dit gewicht wordt berekend, door de waarden "Gewicht curvedag" en "Aantal" van de dieren met elkaar te vermenigvuldigen.
- **Berekend gewicht:** Dit gewicht wordt aan de hand van de voerconsumptie berekend, die in de voercurve is gedefinieerd. Het kan afwijken van "Gewicht curvedag", indien via de handmatige aanpassing meer of minder wordt gevoerd dan door de voercurve is aangegeven. Dit gewicht is belangrijk voor diergroepen die gevoerd worden met een voercurve op basis van de voerhoeveelheid.
- **Diergewicht:** Dit gemiddelde gewicht van de diergroep wordt door TriSort bepaald. De waarde verschijnt alleen bij secties met een TriSort.
- **VM:** De waarde toont de totale dagelijkse hoeveelheid aan verse massa; bij vloeibaar voeren inclusief het toegevoegde water.
- **Ontvangen voer:** De waarde toont de gehele ontvangen voerhoeveelheid per groep; bij de brijvoeding inclusief water.
- **Voerronde uitgevoerd:** De waarde toont het procentuele aandeel reeds gedoseerde dagelijkse hoeveelheid aan voer.
- **QE** biedt de volgende informatie:
 - ☒ Er worden diergroepen **zonder blokkeringsperiode** weergegeven.
 - ☐ Er worden diergroepen **met blokkeringsperiode** weergegeven.

- **QE-blokkering** geeft aan hoeveel dagen de dieren nog zijn geblokkeerd.
- **Dem.rel.:** Deze waarde geeft een overzicht over de totale voeraanpassing. Dit wordt berekend door "Basisaanp.", "Auto.aanp." en "Huid. handm. aanp." te vermenigvuldigen.
- **Dagelijkse hoeveelheid:** De waarde wordt berekend door "VM" en "Aantal" van de dieren te vermenigvuldigen.
- **Huid. handm. aanp.** (Huidige handmatige aanpassing): De waarde toont de handmatige voeraanpassing, die voor de actuele dag geldt, zie hoofdstuk 4.2.2 "Instelling van het voeren bewerken".
- **Basisaanp.:** De waarde toont de constante voeraanpassing.
- **Auto. aanp.** (Factor automatische aanpassing): De waarde toont de voeraanpassing die bepaald is via de vreetijdcorrectie. Dit geldt alleen voor de sensorvoeding.
- **Volgende voerronde:** De waarde toont de gehele voerhoeveelheid in kg voor alle dieren van een groep of een hok, die bij de volgende voeding wordt gedoseerd.
- **Volgende voerronde per dier:** De waarde toont de voerhoeveelheid in kg per dier, die bij de volgende voeding wordt gedoseerd.
- **Handm. aanp.-factor** (Factor handmatige aanpassing): De waarde toont de startfactor van de handmatige voeraanpassing.
- **Uitloopduur:** De waarde toont de periode waarin de handmatige voeraanpassing dient te worden toegepast.
- **Adjustment start date (Startdatum aanpassing):** De start van de handmatige voeraanpassing.
- **DM:** De waarde toont de dagelijkse hoeveelheid aan de pure droge stof per dier.
- **DM88%:** De waarde toont de totale dagelijkse hoeveelheid voer per dier, die 88 % droge stof bevat.
 - Bij het droogvoer zijn de waarden DM88% en VM daarom identiek.
 - Bij brijvoeding geeft de waarde DM88% de hoeveelheid droogvoer aan, zonder dat het pure aandeel droge stof in acht wordt genomen. De waarde Voerhoeveelheid vandaag geeft het volledige mengsel droogvoer-water aan.
- **Datum plaatsing in stal**
- **Tabel voedertijd:** De parameter toont de gebruikte tabel voedertijd, zie hoofdstuk 5.5 "Vreetijdtabel aanmaken". Tabellen voedertijd hangen met de "Auto. aanp." samen.

- **Eval. groepnr.:** Dit nummer wordt handmatig vergeven. Zo kunnen er twee verschillende diergroepen samen of alleen afzonderlijke dieren van een diergroep worden geëvalueerd.
- **Voerfase:** De parameter toont de gebruikte voerfase, hoofdstuk 5.4 "Voederfase aanmaken".
- **Dagen sinds in stal verplaatst:** Dagen die sinds het in stal verplaatsen zijn verstreken.
- **Blokklep:**
 - Om de klep direct volledig te vergrendelen, voert u een X in.
 - Om de volgende voedertijden te blokkeren, voert u het aantal als negatieve waarde in. Bijvoorbeeld: -3 betekent, voor de volgende 3 voedertijden is de klep geblokkeerd.
 - Om de volgende voederdagen te blokkeren, voert u het aantal als positieve waarde in. Bijvoorbeeld: +2 betekent, voor de volgende 2 voederdagen is de klep geblokkeerd.
- **Vaste voerhoeveelheid:** Bij deze parameters kunt u de voerhoeveelheid in kg per voeding invoeren. De voercurve definieert verder de samenstelling en maximale voerhoeveelheid.

Voorbeeld: Een hok moet volgens de voercurve 38 kg verdeeld over 3 voedingen krijgen. De vaste voerhoeveelheid is op 20 kg ingesteld. Het voersysteem doseert bij de eerste voeding 20 kg, bij de tweede voeding ook 20 kg. Zo wordt de dagelijkse hoeveelheid van 38 kg al bij de tweede voeding overschreden. Dienengevolge wordt bij de derde voeding niets gedoseerd.
- **Remaining time (Resterende tijd):** De resterende looptijd van een handmatige voeraanpassing.



Als u een diergroep markeert, krijgt u in het onderste gedeelte van het toepassingsvenster informatie over de volgende thema's:

- Algemeen, zie hoofdstuk 4.2.1
- Voeren, zie hoofdstuk 4.2.2
- Activiteit, zie hoofdstuk 4.2.3
- Voercurve, een pure aanduiding zonder bewerkingmogelijkheid

4.2.1 Algemene diergegevens wijzigen

1. Klik op het tabblad "Populatieboek".
2. Markeer de gewenste diergroep in de tabel.
3. Klik onder "Algemeen" op "Bewerken".

Populatieboek Voerboek Behandelingenboek Dierversplaatsingen voerbeoordeling Stamevaluatie Trogbewaking

Gebruik de selectie Onthoud selectie Selectie verwijderen Snelfilter Verberg groepen

Locatie	Groepnr.	Aantal	Voercurve	Curvedag	Trend	Gewicht curvedag	Curvedag gewicht van groep	Berekend gewicht	Diergewicht
Stal: Fokhuis biggen									
Afdeling: Fokgebied biggen 1									
Kooi 3-1-4	20	30	Verzorgingsperiode	35	→	13,92 kg	417,60 kg	13,54 kg	577,13 kg
Kooi 3-1-3	20	30	Verzorgingsperiode	35	→	13,92 kg	417,60 kg	13,54 kg	577,13 kg
Kooi 3-1-2	20	30	Verzorgingsperiode	35	→	13,92 kg	417,60 kg	13,54 kg	577,13 kg
Kooi 3-1-1	20	30	Verzorgingsperiode	35	→	13,92 kg	417,60 kg	13,54 kg	577,13 kg
Kooi 3-1-5	20	30	Verzorgingsperiode	35	→	13,92 kg	417,60 kg	13,54 kg	577,13 kg
Kooi 3-1-6	20	30	Verzorgingsperiode	35	→	13,92 kg	417,60 kg	13,54 kg	577,13 kg
Afdeling: Fokgebied biggen 2									
Kooi 3-2-6	21	30	Verzorgingsperiode	26	→	15,82 kg	474,60 kg	15,44 kg	634,00 kg
Kooi 3-2-5	21	30	Verzorgingsperiode	26	→	15,82 kg	474,60 kg	15,44 kg	634,00 kg
Kooi 3-2-3	21	30	Verzorgingsperiode	26	→	15,82 kg	474,60 kg	15,44 kg	634,00 kg
Kooi 3-2-2	21	30	Verzorgingsperiode	26	→	15,82 kg	474,60 kg	15,44 kg	634,00 kg
Kooi 3-2-4	21	30	Verzorgingsperiode	26	→	15,82 kg	474,60 kg	15,44 kg	634,00 kg
Kooi 3-2-1	21	30	Verzorgingsperiode	26	→	15,82 kg	474,60 kg	15,44 kg	634,00 kg
Afdeling: Fokgebied biggen 3									
Kooi 3-3-5	22	30	Verzorgingsperiode	34	→	18,86 kg	565,75 kg	18,48 kg	725,00 kg
Kooi 3-3-6	22	30	Verzorgingsperiode	34	→	18,86 kg	565,75 kg	18,48 kg	725,00 kg
2.580									

Algemeen Groepnr. 20 Datum in stal plaatsen 11.04.2018 Commentaar

Voeren Evaluatie groepnr. Gewicht bij in stal plaatsen 6,00 kg

Activiteit Aantal dieren 30 Dagen in afdeling 35

Voercurve Ras Regel

Bewerken

4. Wijzig in het volgende dialoogvenster de overeenkomstige gegevens.

Algemene eigenschappen ...

Groepnr.	20	Datum in stal plaatsen	1-9-2022	Commentaar
Evaluatie groepnr.		Gewicht bij in stal plaatsen	6,00 kg	
Aantal dieren	30	Dagen in afdeling	21	
Ras				
Regel				

OK Annuleren

5. Klik op "OK" om de wijzigingen over te nemen.

4.2.2 Instelling van het voeren bewerken

1. Klik op het tabblad "Populatieboek".
2. Markeer de gewenste diergroep in de tabel.
3. Klik onder "Voeren" op "Bewerken".

4. Wijzig in het volgende dialoogvenster de overeenkomstige gegevens. Als u in de cel "Handmatige aanpassing" klikt, wordt er een uitgebreid dialoogvenster geopend.

Handmatige aanpassing

Via de handmatige aanpassing kunt u de voerhoeveelheid achteraf reguleren, door deze bijvoorbeeld voor een bepaalde periode te verhogen.

- **Startfactor:** Vooraf ingevoerde gegevens met hoeveel procent de dagelijkse voerhoeveelheid moet worden verhoogd. Bij 120 % krijgen de dieren vanaf de startdatum 20 % meer voer dan waarop de voercurve is ingesteld.
- **Uitloopduur:** Aantal dagen waarop de dieren een grotere hoeveelheid voer moeten krijgen. Als de parameter "Constance factor" niet actief is, wordt de procentuele verhoging van de voerhoeveelheid dagelijks stapsgewijs teruggehaald, tot de dieren weer de standaard voerhoeveelheid krijgen, overeenkomstig de voercurve.
- **Startdatum:** Start van de verhoging van de hoeveelheid voer
- **Constance factor:** De vooraf ingevoerde gegevens onder "Startfactor" wordt constant gehouden over het aantal dagen onder "Uitloopduur". Dit betekent dat de dieren constant een hogere voerhoeveelheid gedurende een bepaalde periode krijgen.

5. Klik op "OK" om de wijzigingen over te nemen.

4.2.3 Activiteiten bewerken

1. Klik op het tabblad "Populatieboek".
2. Markeer de gewenste diergroep in de tabel.
3. Klik op "Activiteit".

De lijst toont chronologisch alle activiteiten van de geselecteerde diergroep. Als u een beschikbare activiteit markeert, krijgt u rechts in het deelvenster meer informatie te zien over de activiteit.

The screenshot displays the 'Populatieboek' (Population Book) tab in the BigFarmNet software. The main table lists activities for various groups of pigs, including 'Kooi 3-1-4' through 'Kooi 3-3-6'. The 'Activiteit' button is highlighted with a hand icon. The 'Activiteitdetails' panel on the right shows details for a 'Behandeling (Handmatig)' activity on 14.04.2018, including date, user, type, dose, and veterinarian.

Locatie	Groepnr.	Aantal	Voercurve	Curvedag	Trend	Gewicht curvedag	Curvedag gewicht van groep	Berekend gewicht	Diergewicht
Stal: Fokhuis biggen									
Afdeling: Fokgebied biggen 1									
Kooi 3-1-4	20	30	Verzorgingsperiode	35	→	13,92 kg	417,60 kg	13,54 kg	577,13 kg
Kooi 3-1-3	20	30	Verzorgingsperiode	35	→	13,92 kg	417,60 kg	13,54 kg	577,13 kg
Kooi 3-1-2	20	30	Verzorgingsperiode	35	→	13,92 kg	417,60 kg	13,54 kg	577,13 kg
Kooi 3-1-1	20	30	Verzorgingsperiode	35	→	13,92 kg	417,60 kg	13,54 kg	577,13 kg
Kooi 3-1-5	20	30	Verzorgingsperiode	35	→	13,92 kg	417,60 kg	13,54 kg	577,13 kg
Kooi 3-1-6	20	30	Verzorgingsperiode	35	→	13,92 kg	417,60 kg	13,54 kg	577,13 kg
Afdeling: Fokgebied biggen 2									
Kooi 3-2-6	21	30	Verzorgingsperiode	26	→	15,82 kg	474,60 kg	15,44 kg	634,00 kg
Kooi 3-2-5	21	30	Verzorgingsperiode	26	→	15,82 kg	474,60 kg	15,44 kg	634,00 kg
Kooi 3-2-3	21	30	Verzorgingsperiode	26	→	15,82 kg	474,60 kg	15,44 kg	634,00 kg
Kooi 3-2-2	21	30	Verzorgingsperiode	26	→	15,82 kg	474,60 kg	15,44 kg	634,00 kg
Kooi 3-2-4	21	30	Verzorgingsperiode	26	→	15,82 kg	474,60 kg	15,44 kg	634,00 kg
Kooi 3-2-1	21	30	Verzorgingsperiode	26	→	15,82 kg	474,60 kg	15,44 kg	634,00 kg
Afdeling: Fokgebied biggen 3									
Kooi 3-3-5	22	30	Verzorgingsperiode	34	→	18,86 kg	565,75 kg	18,48 kg	725,00 kg
Kooi 3-3-6	22	30	Verzorgingsperiode	34	→	18,86 kg	565,75 kg	18,48 kg	725,00 kg

2.580

Algemeen Beschrijving Datum
 Voeren Behandeling (Handmatig) 14.04.2018
 In stal 11.04.2018

Activiteitdetails

Datum	8-9-2022 02:00
Gebruiker	
Type	Medische behandeling
Medicijn	2
Dosis	1
Doseereenheid	ml
Uitbreiding	dier
Behandelduur	3 d
Wachttijd	5 d
Veearts	Dr. Carl Lewis

+ Nieuwe activiteit ✎ Bewerken - Verwijderen

- U kunt de beschikbare activiteiten bewerken of verwijderen.
- U kunt nieuwe activiteiten toevoegen.

Selecteer een activiteit

Activiteitstypen

- Behandeling
- Dood
- Extra gebruik
- Fysieke conditie
- Uit stal
- Verplaatsen

OK Annuleren

Uit de stal verwijderde of dood gemarkeerde dieren "herstellen"

Als u vanuit een locatie **slechts enkele** dieren per ongeluk hebt verwijderd, kunt u dit proces in het populatiehandboek ongedaan maken. Markeer en wis de niet gewenste activiteit "Uit stal".

Als u vanuit een locatie **alle** dieren per ongeluk hebt verwijderd, kunt u dit proces alleen onder "Verplaatsen" ongedaan maken, zie hoofdstuk 4.5. Omdat de locatie na het per ongeluk uitgevoerde proces geen dieren meer bevat, wordt de locatie niet meer in het populatieboek weergegeven.

Hetzelfde geldt voor dood gemarkeerde dieren (activiteit "Dood/Dood dier").

4.2.4 Diergroepen meervoudige bewerking

U kunt de volgende instellingen en activiteiten bij meerdere diergroepen tegelijkertijd uitvoeren:

- **Bewerken mestvarkengroepen:** Bijvoorbeeld Gewicht, Curvedag, Voercurve, Handmatige voeraanpassing, Blokklep
- **Activiteiten toevoegen aan groepen:** Verwijderen, Verplaatsen, Behandeling, Dood, Gebruik van additieven

1. Klik op het tabblad "Populatieboek".

2. Markeer meerdere diergroepen als volgt:

- Aangrenzende diergroepen markeren:

Markeer met een klik de eerste diergroep, houdt de omschakelknop ingedrukt en klik op de laatste diergroep die gemarkeerd moet worden.

- Niet aangrenzende diergroepen markeren:

Markeer met een klik de eerste diergroep, houdt de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de diergroepen die u wilt markeren.

- Alle diergroepen markeren:

Markeer met een klik de eerste diergroep, houdt de Ctrl-toets ingedrukt en druk op toets A.



LET OP!

U kunt ook slechts één diergroep markeren en het contextmenu voor bewerken opvragen.

3. Door rechts te klikken in het gemarkeerde bereik opent u het contextmenu.

Locatie	Groepnr.	Aantal	Voercurve	Curvedag
Stal: Fokhuis biggen				
Afdeling: Fokgebied biggen 1				
Kooi 3-1-1	20	30	Verzorgingsperiode	22
Kooi 3-1-2	20			22
Kooi 3-1-3	20			22
Kooi 3-1-4	20			22
Kooi 3-1-5	20	30	Verzorgingsperiode	22
Kooi 3-1-6	20	30	Verzorgingsperiode	22
Afdeling: Fokgebied biggen 2				

- Als u onder "Activiteiten toevoegen aan groepen" een activiteit selecteert, wordt het desbetreffende dialoogvenster voor de activiteit geopend.
- Als u "Bewerken mestvarkengroepen" selecteert, opent het dialoogvenster, waarin de diergegevens en de gegevens voor de voeding bewerkt kunnen worden.

In het dialoogvenster kunt u de gegevens voor alle geselecteerde diergroepen wijzigen of alleen voor geselecteerde diergroepen.

Meervoudig bewerken slatgegevens mestvarkengroep

Wijzigingen

☐ Groepnr. 20

☐ Ras

☐ Regel

☐ Gewicht 9,80 kg

☐ Curvedag 21

☐ Voercurve Verzorgingsperiode

☐ Vaste voerhoeveelheid 0,0 kg

☐ Basisaanpassing 0 %

☒ Aanp. startfactor 0 %

☒ Aanp. startdatum 28-9-2022

☐ Aanp. duur (in dagen) 1

☐ Aanp.-factor is constant Nee

☐ Blokklep

Alles aanvinken Niets aanvinken

Toepassen op selectie

Alles selecteren

Locatie	Groepnr.	RasID	Regel	Voercurve	Curvedag	Gewicht	Vaste vo...	Basisaan...	Aanp. St...	Aanp. duur	Aanp.
Kooi 3-1-1	20			Verzorgi...	21	9,80 kg	0,0 kg	100 %	1-1-1970	1	100 %
Kooi 3-1-2	20			Verzorgi...	21	9,80 kg	0,0 kg	100 %	1-1-1970	1	100 %
Kooi 3-1-3	20			Verzorgi...	21	9,80 kg	0,0 kg	100 %	1-1-1970	1	100 %

- Selecteer alle of slechts afzonderlijke diergroepen.
- Wijzig de gegevens.
- Klik op "Toepassen op selectie".

De gegevens worden bij de geselecteerde diergroepen gewijzigd.

- Klik vervolgens op "OK" om de wijzigingen op te slaan.

4.2.5 Behandeling verrichten

In het systeem kunt u twee soorten behandeling voor uw dieren selecteren:

- **Handmatige behandeling** = Enting of medicijnen met injecties toedienen, documenteren van de behandeling achteraf is mogelijk.
- **Medische behandeling** = Met behulp van de installatie additieven via het voer toedienen; vooraf geplande behandelingen definiëren.



LET OP!

De medische behandeltaak kan achteraf onder "Activiteit" **niet** worden verwijderd.

Handmatige behandeling

1. Klik op het tabblad "Populatieboek".
2. Markeer één of meerdere diergroepen.
3. Door rechts te klikken in het gemarkeerde bereik opent u het contextmenu.
4. Klik onder "Activiteiten toevoegen aan groepen" op "Behandeling".

Locatie	Groepnr.	Aantal	Voercurve	Curvedag	Trend
Stal: Fokhuis biggen					
Afdeling: Fokgebied biggen 1					
Kooi 3-1-1	20			22	→
Kooi 3-1-2	20			22	→
Kooi 3-1-3	20				
Kooi 3-1-4	20	30	Verzorgingsperiode		
Kooi 3-1-5	20	30	Verzorgingsperiode		
Kooi 3-1-6	20	30	Verzorgingsperiode		
Afdeling: Fokgebied biggen 2					
Kooi 3-2-1	21	30	Verzorgingsperiode		
Kooi 3-2-2	21	30	Verzorgingsperiode	27	→
Kooi 3-2-3	21	30	Verzorgingsperiode	27	→
Kooi 3-2-4	21	30	Verzorgingsperiode	27	→

Bewerken mestvarkengroepen...

activiteiten toevoegen aan groepen ▶

Uit stal

Verplaatsen

Behandeling

Dood

Additiefgebruik

5. Selecteer in het volgende dialoogvenster "Handmatige behandeling" en klik op "Volgende".

Dieren medicijnen toedienen

Selecteer medische behandeling

☒ Handmatige behandeling
U heeft een behandeling zelf uitgevoerd of gaat dit doen

☐ Medische behandeltaken
Wilt u een behandeltaak specificeren voor uitvoering door uw apparatuur

> Volgende ✕ Annuleren

6. Definieer in het volgende dialoogvenster voor alle diergroepen dezelfde behandelingsdetails of voor elke diergroep afzonderlijke behandelingsdetails.
- **Startdatum** = datum van de medicatie; terugwerkende vermeldingen zijn mogelijk
 - **Type** = enting of medische behandeling
 - **Vaccineren** of **Medicijn** = afhankelijk van de invoer van het medicijn of entstof
 - **Dosis** = hoeveelheid toegediend medicijn of entstof

Vetgedrukte parameters zijn verplichte velden. Alle overige invoer is optioneel.

Dieren medicijnen toedienen

Medicijn

Voor behandeling geselecteerde dieren Selecteer alles ☒

Mestdierlocatie	Sluitdatum	Inenting	Medicijn	Dosis	Behandeld
Fokhuis biggen Fokgebied biggen 1 Kooi 3-1-1 (30 animals)	27-9-2022			0	0
Fokhuis biggen Fokgebied biggen 1 Kooi 3-1-2 (30 animals)	27-9-2022			0	0
Fokhuis biggen Fokgebied biggen 1 Kooi 3-1-3 (30 animals)	27-9-2022			0	0

Dierdetails: 90 dieren

Startdatum: 27-9-2022 **Dosis:** 0,00 **Routetype:**
Type: **Behandelingsdagen:** **Dag(en)** **Behandelingsreden:** ☐ Routine ☒ Ziekte
Medicijn **Wachtijd:** **Dag(en)** **Behandeling:**
Batchnummer: **Veearts:** **Documentnr.:** **Technicus:** **Commentaar:**

✓ Opslaan ✕ Annuleren

7. Als u voor alle diergroepen behandelingsdetails hebt opgeslagen, klikt u op "Opslaan".

Medische behandeling

1. Klik op het tabblad "Populatieboek".
2. Markeer één of meerdere diergroepen.
3. Door rechts te klikken in het gemarkeerde bereik opent u het contextmenu.
4. Klik onder "Activiteiten toevoegen aan groepen" op "Behandeling".

Locatie	Groepnr.	Aantal	Voercurve	Curvedag	Trend
Stal: Fokhuis biggen					
Afdeling: Fokgebied biggen 1					
Afdeling: Fokgebied biggen 2					
Kooi 3-2-1	21	30	Verzorgingsperiode	27	→
Kooi 3-2-2	21	30	Verzorgingsperiode	27	→
Kooi 3-2-3	21	30	Verzorgingsperiode	27	→
Kooi 3-2-4	21	30	Verzorgingsperiode	27	→
Kooi 3-2-5	21	30	Verzorgingsperiode	27	→
Kooi 3-2-6	21	30	Verzorgingsperiode	27	→
Afdeling: Fokgebied biggen 3					
Afdeling: Fokgebied biggen 4					
Afdeling: Fokgebied biggen 5					
Stal: Fokhuis					
Afdeling: Grote groep 1					
Links	30	142	Afwerkingsperiode		
Rechts	30	158	Afwerkingsperiode	53	→
Afdeling: Grote groep 2					

5. Selecteer in het volgende dialoogvenster "Medische behandeling" en klik op "Volgende".

Dieren medicijnen toedienen

Selecteer medische behandeling

☐ Handmatige behandeling
U heeft een behandeling zelf uitgevoerd of gaat dit doen

☒ Medische behandeltaken
Wilt u een behandeltaak specificeren voor uitvoering door uw apparatuur

Volgende
Annuleren

6. Activeer de injectiepunten.

De injectiepunten worden afhankelijk van het voersysteem weergegeven. Bovendien kan onder "Medicator" de bijbehorende doseereenheid kleine hoeveelheden worden geselecteerd.

Injectiepunt	Medicator	Potentieel aantal doeldieren	Doel behandelde d
☒ DryExactPro / Circuit [1]	MineralDosingUn...	30	30

Afhankelijk van het injectiepunt worden de dieren conform hun behandelingsstatus in 4 kleurcategorieën ingedeeld:

- 4 Alle door u voor behandeling geselecteerde dieren.
- 4 dieren die worden behandeld volgens het geselecteerde voedingspunt.
- 0 dieren die niet volgens het geselecteerde voedingspunt worden behandeld.

Deze dieren kunt u voor selectie toevoegen door het selectievakje voor "Dieren die geen medicijn hebben gekregen toevoegen aan selectie" aan te klikken. Aan het einde van het behandelingsvenster wordt een dialoogvenster geopend, waarin u de selectie kunt opslaan. Via de knop "Selectie gebruiken" kunt u voor deze dieren de activiteit "Behandeling" zoals hierboven beschreven weer starten (hoofdstuk 4.1.3 "Filterresultaat").

- 0 dieren die niet voor behandeling zijn geselecteerd, maar door de behandeling wel zijn betroffen. Deze dieren bevinden zich op dezelfde locatie als de te behandelen dieren, waar echter geen afzonderlijke behandeling voor een dier via het injectiepunt mogelijk is.

Dieren te behandelen via de injectiepunten

Mestdierlocatie	Sluitdatum	Medicijn	Dosis	Behandeldagen	Wachttijd
Behandelde dieren					
Fokhuis biggen Fokgebied biggen 1 Kooi 3-1-1 (30 animals)	28-9-2022		0	0	0
Fokhuis biggen Fokgebied biggen 1 Kooi 3-1-2 (30 animals)	28-9-2022		0	0	0
Dieren niet behandeld via de injectiepunten					
Fokhuis Grote groep 1 Links (142 animals)	-	-	-	-	-
Fokhuis Grote groep 1 Rechts (158 animals)	-	-	-	-	-

☒ Dieren die geen medicijn hebben gekregen toevoegen aan selectie

360

Geselecteerde dieren

60

Behandelde dieren

300

waar geen medicijn aan is toeg

0

Extra behandelde dieren

7. Klik op "Volgende".

8. Vul in het tabblad de volgende verplichte velden in:

- **Startdatum** = datum van de medicatie; terugwerkende vermeldingen zijn niet mogelijk
- **Typ** = vooraf ingesteld als medische behandeling; geen wijziging mogelijk
- **Medicijn** = weergave van het medicijn
- **Dosis** = hoeveelheid toegediend medicijn

Alle overige invoer is optioneel.

Dieren medicijnen toedienen

Injectie **Medicijn: DryExactPro / Circuit [1]**

Voor behandeling geselecteerde dieren Selecteer alles ☒

Mestdierlocatie	Sluitdatum	Medicijn	Dosis	Behandeldagen	Wachttijd
Fokhuis biggen Fokgebied biggen 1 Kooi 3-1-1 (30 animals)	29-9-2022		0	0	0
Fokhuis biggen Fokgebied biggen 1 Kooi 3-1-2 (30 animals)	29-9-2022		0	0	0

Dierdetails: 60 dieren

Startdatum: 29-9-2022

Type: Medische behandeling

Medicijn:

Batchnummer:

Documentnr.:

Dosis: 0,00

Behandelingsdagen:

Wachttijd:

Veearts:

Technicus:

Routetype:

Behandelingsred: ☐ Routine ☒ Ziekte


Behandeling:

Commentaar:


☒ Toon waarschuwingsbericht indien inhoud in medicatie(s) niet overeenkomt met geselecteerde medicatie

9. Als u voor alle diergroepen behandelingsdetails hebt opgeslagen, klikt u op "Opslaan".

4.3 Voerboek



Het voerboek biedt u een overzicht over het voerverbruik van uw veebestand of een geselecteerde diergroep.



In het bovenste deel selecteert u de Tijdsperiode evaluatie voor het voerverbruik:

- Met < > tussen afzonderlijke dagen wisselen.
- Met behulp van de kalender een bepaalde dag selecteren.



-  actuele dag weergeven / naar actuele dag terugkeren.
-  actuele week weergeven.
-  actuele maand weergeven.
- Mestperiode in bepaalde periode weergeven.


 Van: Naar:

Het middelste deel toont de voedertijden per diergroep. U kunt per voedertijd aflezen welke voerhoeveelheid de dieren hebben gekregen.

Het onderste deel geeft het voerverbruik per klep als diagram weer.

4.4 Behandelingenboek

Populatieboek
 Voerboek
 Behandelingenboek
 Dierverplaatsingen
 voerbeoordeling
 Stamevaluatie
 Trog

Gebruik de selectie
 Onthoud selectie
 Selectie verwijderen
 Snelfilter
 ☐ Verberg groepen

In het Behandelingenboek vindt u alle gegevens over de medische behandelingen van uw dieren. Bovendien krijgt u informatie over blokkeringsperioden, die na een medicatie tot aan de verkoop of het slachten van de dieren moeten worden afgewacht.

Populatieboek	Voerboek	Behandelingenboek	Dierverplaatsingen	voerbeoordeling	Stamevaluatie	Trogbewaking			
Gebruik de selectie	Onthoud selectie	Selectie verwijderen	Snelfilter	☐ Verberg groepen					
Tijdperiode evaluatie									
				01.03.2016 - 31.03.2016		 Nu			
Locatie	Groepnr.	Veearts	Medicijn	Datum	Behandelduur [dagen]	Wachttijd [dagen]	Verwachte einddatum	Verwachte einddatum [dagen]	Chargennummer
- Stal: Fokhuis biggen									
- Afdeling: Fokgebied biggen 1									
Kooi 3-1-1	20	Dr. Hans Meyer	2	26.03.2016	3	5	01.01.1970		0 45558889
Kooi 3-1-2	20	Dr. Hans Meyer	2	26.03.2016	3	5	01.01.1970		0 45558889
Kooi 3-1-3	20	Dr. Hans Meyer	2	26.03.2016	3	5	01.01.1970		0 45558889
Kooi 3-1-4	20	Dr. Hans Meyer	2	26.03.2016	3	5	01.01.1970		0 45558889
Kooi 3-1-5	20	Dr. Hans Meyer	2	26.03.2016	3	5	01.01.1970		0 45558889
Kooi 3-1-6	20	Dr. Hans Meyer	2	26.03.2016	3	5	01.01.1970		0 45558889
- Afdeling: Fokgebied biggen 2									
Kooi 3-2-1	21	Dr. Hans Meyer	2	21.03.2016	3	5	01.01.1970		0 45558889
Kooi 3-2-2	21	Dr. Hans Meyer	2	21.03.2016	3	5	01.01.1970		0 45558889
Kooi 3-2-3	21	Dr. Hans Meyer	2	21.03.2016	3	5	01.01.1970		0 45558889
Kooi 3-2-4	21	Dr. Hans Meyer	2	21.03.2016	3	5	01.01.1970		0 45558889
Kooi 3-2-5	21	Dr. Hans Meyer	2	21.03.2016	3	5	01.01.1970		0 45558889
Kooi 3-2-6	21	Dr. Hans Meyer	2	21.03.2016	3	5	01.01.1970		0 45558889

Filter met behulp van de filterfuncties de gewenste diergroepen, zie hoofdstuk 4.1 "Filterfuncties". Onder "Tijdperiode evaluatie" selecteert u de gewenste behandelingsperiode, zie de toelichting in hoofdstuk 4.3 "Voerboek".

4.5 Dierbewegingen

Populatieboek Voerboek Behandelingenboek **Diervverplaatsingen** voerbeoordeling Stamevaluatie Trogbewaking

Gebruik de selectie Onthoud selectie Selectie verwijderen  Snelfilter ☐ Verberg groepen

Onder Diervverplaatsingen vindt u alle processen voor In stal plaatsen, Verplaatsen en Uit stal verwijderen. Ook de activiteit "Dood/Dood dier" wordt hier onder Diervverplaatsingen vermeld.

Populatieboek

Voorboek

Behandelingenboek

Diervverplaatsingen

voerbeoordeling

Stamevaluatie

Trogbewaking

Gebruik de selectie

Onthoud selectie

Selectie verwijderen

Snelfilter

☐ Verberg groepen

Tijdperiode evaluatie

<1

2

30

>

<

01.03.2016 - 31.03.2016

>

Nu

Locatie	Groepnr.	Datum	Verwijderingstype	Aantal dieren	Groepsgewicht	Bronlocatie	Leverancier	Klant	leveringsnummer
- Stal: Fokhuis biggen									
- Afdeling: Fokgebied biggen 1									
Kooi 3-1-1	20	23.03.2016	In stal geplaatst	30	180,00 kg		Hypor Deutschla...		885522
Kooi 3-1-2	20	23.03.2016	In stal geplaatst	30	180,00 kg		Hypor Deutschla...		885522
Kooi 3-1-3	20	23.03.2016	In stal geplaatst	30	180,00 kg		Hypor Deutschla...		885522
Kooi 3-1-4	20	23.03.2016	In stal geplaatst	30	180,00 kg		Hypor Deutschla...		885522
Kooi 3-1-5	20	23.03.2016	In stal geplaatst	30	180,00 kg		Hypor Deutschla...		885522
Kooi 3-1-6	20	23.03.2016	In stal geplaatst	30	180,00 kg		Hypor Deutschla...		885522
- Afdeling: Fokgebied biggen 2									
Kooi 3-2-1	21	18.03.2016	In stal geplaatst	30	180,00 kg		Hypor Deutschla...		885522
Kooi 3-2-2	21	18.03.2016	In stal geplaatst	30	180,00 kg		Hypor Deutschla...		885522
Kooi 3-2-3	21	18.03.2016	In stal geplaatst	30	180,00 kg		Hypor Deutschla...		885522
Kooi 3-2-4	21	18.03.2016	In stal geplaatst	30	180,00 kg		Hypor Deutschla...		885522
Kooi 3-2-5	21	18.03.2016	In stal geplaatst	30	180,00 kg		Hypor Deutschla...		885522
Kooi 3-2-6	21	18.03.2016	In stal geplaatst	30	180,00 kg		Hypor Deutschla...		885522

Filter met behulp van de filterfuncties de gewenste diergroepen, zie hoofdstuk 4.1 "Filterfuncties". Onder "Tijdperiode evaluatie" selecteert u de gewenste periode, zie de toelichting in hoofdstuk 4.3 "Voorboek".

4.5.1 Diervverplaatsingen bewerken/verwijderen

Als u een diervverplaatsing bewerkt of ongedaan wilt maken, gaat u als volgt te werk:

1. Filteren en markeren van de diervverplaatsing.
2. Open het contextmenu met een rechterklik op het gemarkeerde gebied.

Populatieboek Voerboek Behandelingenboek **Diervverplaatsingen** voer

Gebruik de selectie Onthoud selectie Selectie verwijderen

Tijdperiode evaluatie

<1

2

30

>

<

Locatie	Groepnr.	Datum	Verwijderingstype
- Stal: Fokhuis biggen			
- Afdeling: Fokgebied biggen 3			
Kooi 3-3-1			Uit stal
Kooi 3-3-2			Dood

 **Activiteit bewerken...**
Verwijder activiteit...

3. Selecteer de gewenste bewerking.

4.6 Voerbeoordeling

Populatieboek		Voerboek		Behandelingenboek		Dierverplaatsingen		voerbeoordeling		Stamevaluatie		Trogbewaking									
Gebruik de selectie		Onthoud selectie		Selectie verwijderen		Snelfilt		Fresh mass		Totale hoeveelheid											
				Vandaag		-1		-2		-3		-4		-5		-6					
Hok		Dieren		Gewicht curvedag		Diergewicht		Ontvangen		11.05.2016		10.05.2016		09.05.2016		08.05.2016		07.05.2016		06.05.2016	
- Stal: Fokhuis biggen																					
- Afdeling: Fokgebied biggen 1																					
Kooi 3-1-1		20		30		13,92 kg		11,40 kg		22,60 kg		22,40 kg		22,20 kg		22,00 kg		21,80 kg		21,60 kg	
Kooi 3-1-2		20		30		13,92 kg		11,40 kg		22,60 kg		22,40 kg		22,20 kg		22,00 kg		21,80 kg		21,60 kg	
Kooi 3-1-3		20		30		13,92 kg		11,40 kg		22,60 kg		22,40 kg		22,20 kg		22,00 kg		21,80 kg		21,60 kg	
Kooi 3-1-4		20		30		13,92 kg		11,40 kg		22,60 kg		22,40 kg		22,20 kg		22,00 kg		21,80 kg		21,60 kg	
Kooi 3-1-5		20		30		13,92 kg		11,40 kg		22,60 kg		22,40 kg		22,20 kg		22,00 kg		21,80 kg		21,60 kg	
Kooi 3-1-6		20		30		13,92 kg		11,40 kg		22,60 kg		22,40 kg		22,20 kg		22,00 kg		21,80 kg		21,60 kg	
- Afdeling: Fokgebied biggen 2																					

De Voerbeoordeling biedt u een overzicht over het vreetgedrag van de dieren op de actuele dag en van de laatste zes dagen.

4.7 Stamevaluatie


In de Stamevaluatie krijgt u een overzicht over het succes van uw veebestand.

1. Filter de gewenste diergroepen via de boerderijstructuur en/of via de afgelopen periodes 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar.

Met de knop "Alles" verwerpt u de selectie van een bepaalde afgelopen periode.

BigFarmNet-manager											
Manager Activiteit configuratie Set-up Help											
2 alarmen											
Stop uitrusting											
Hof Bergstrop Zeughuis Nieuw huis Fokhuis biggen Fokhuis Grote groep 1 Grote groep 2 Grote groep 3 Sectie 1 Sectie 2											
Populatieboek Voerboek Behandelingenboek Dierverplaatsingen voerbeoordeling Stamevaluatie Trogbewaking											
Selecteer evaluatietype Batch 3 maanden 6 maanden 1 jaar Alles											
Datum in stal	Leverancier	Voeder. groepr.	Eval. groepr.	Aantal dieren	ID-kenmerk	Secties	Vergelijken				
21-8-2022	Hypor - Hypor Deutschland GmbH	40		168	885522	Sectie 1	☒				
14-8-2022	Hypor - Hypor Deutschland GmbH	41		168	885522	Sectie 2	☐				
8-8-2022	Hypor - Hypor Deutschland GmbH	30		300	885522	Grote groep 1	☐				
7-8-2022	Hypor - Hypor Deutschland GmbH	42		168	885522	Sectie 3	☐				
31-7-2022	Hypor - Hypor Deutschland GmbH	43		168	885522	Sectie 4	☐				
27-7-2022	Hypor - Hypor Deutschland GmbH	31		300	885522	Grote groep 2	☐				
24-7-2022	Hypor - Hypor Deutschland GmbH	44		168	885522	Sectie 5	☐				
13-7-2022	Hypor - Hypor Deutschland GmbH	32		300	885522	Grote groep 3	☐				

2. Selecteer het gewenste evaluatietype:



Datum in stal plaatsen	Le	r.	eval. groepnr.	Aantal dieren
23-9-2022				2
1-9-2022	West - West Pig AG	20		1
27-8-2022	West - West Pig AG	21		1
19-8-2022	West - West Pig AG	22		1
13-8-2022	West - West Pig AG	23		1

- **Batch:**
 - > Diergroepen met dezelfde Datum in stal plaatsen en van dezelfde leverancier worden bij elkaar opgeteld weergegeven.
 - > Diergroepen met dezelfde Datum in stal plaatsen, echter van twee verschillende leveranciers worden afzonderlijk in twee regels weergegeven.
- **Locatie:** De gehele boerderijstructuur wordt weergegeven.
- **Verkoopbestelling:**
 - > Diergroepen met dezelfde Datum in stal plaatsen worden bij elkaar opgeteld weergegeven.
 - > Diergroepen met dezelfde Datum in stal plaatsen, die op verschillende tijden aan verschillende klanten zijn verkocht, worden in afzonderlijke regels weergegeven.
- **Kleppen:** De actuele diergroepen worden op basis van de bijbehorende kleppen en circuits beoordeeld.

** LET OP!**

Indien u eerder op de boerderijstructuur hebt gefilterd, wordt alleen de geselecteerde locatie / het circuit met de bijbehorende diergroepen / voerkleppen weergegeven.

3. U kunt uw huidige selectie ook beperken op basis van het Voedergroepnr. of Evaluatiegroepnr.

Populatieboek

Voorboek

Behandelingenboek

Diervoorplaatsingen

voerbeoordeling

Stamevaluatie

Trogbewaking

Selecteer evaluatietype

Batch

3 maanden

6 maanden

1 jaar

Alles

Geen


Geen

Voedergroepnr.

Evaluatie groepnr.

Datum in stal plaatsen	Leverancier	Voeder. groepnr.	Eval. groepnr.	Aantal dieren	ID-kenmerk	Secties		
13-7-2022	West - West Pig AG	41		300	898	Grote groep 3		
21-8-2022	West - West Pig AG	43		168	898	Sectie 1	☐	...
14-8-2022	West - West Pig AG	44		168	898	Sectie 2	☐	...
7-8-2022	West - West Pig AG	45		168	898	Sectie 3		


Als u een regel markeert, krijgt u in het bereik "Detail" de bijbehorende informatie:



- **Voeren:** Het diagram geeft de voercomponenten in verhouding tot de voerhoeveelheid en voerkosten weer.
- **Vermogen:** De werkelijke gewichtstoename van uw dieren wordt weergegeven. Het cirkeldiagram geeft het totale aantal diergroepen in verhouding tot de uit de stal verwijderde en uit de stal verplaatste dieren weer.
- **Uitsorteren:** Deze tabel bevat alleen informatie in combinatie met de TriSort.

4.8 Trogbewaking

De Trogbewaking geeft de status van uw trogsensoren weer (leeg of niet leeg). Bovendien krijgt u informatie over de vreesnelheid, vreettijd evenals de laatste voeding conform de sensor. Het diagram rechtsonder toont het statusverloop van de actuele dag evenals de laatste 6 dagen.



Ook al wordt de trogstatus regelmatig opgevraagd, u kunt de huidige trogstatus direct handmatig opvragen:

1. Klik in de kolom **Status op** op het kleursymbool van de gewenste trog.

Het dialoogvenster "Trogstatus verversen" wordt geopend.



2. Bevestig het dialoogvenster met "OK".


4.9 Gegevensexport

In het fokbeheer kunt u de gegevens uit de volgende gebieden naar een Excel-tabel exporteren:


- Voerboek
- Behandelingenboek
- Voerbeoordeling
- Stamevaluatie

Hier worden alle gegevens van het volledige fokbereik onafhankelijk van het locatiefilter geëxporteerd.


1. Klik op het gewenste tabblad.
2. Klik in het Menu "Manager" op "Exporteer".



- Als u gegevens uit **Voerbeoordeling** of **Stamevaluatie** exporteert, wordt direct het dialoogvenster "Opslaan als" van uw besturingssysteem geopend.
- Als u gegevens uit het **Behandelingenboek** exporteert, opent er een dialoogvenster, waarin u de periode moet selecteren. Bevestigen met "OK" en het dialoogvenster "Opslaan als" van uw besturingssysteem wordt geopend.



- Als u gegevens uit het **Voerboek** exporteert, wordt er een dialoogvenster geopend, waarin u bovendien de periode voor de volgende selectie moet selecteren:




The screenshot shows a dialog box titled "Voerronde exporteren ...". It has two date pickers: "Startdatum" and "Einddatum", both set to "4-10-2022". Below these are three radio button options: "All feedings" (selected), "Per day per valve", and "Per chosen interval per valve". At the bottom are two buttons: "OK" and "Annuleren".

- "All feedings" (Alle voedingen): Alle voedingen (eventueel meerdere per dag) per klep worden in de geselecteerde periode geëxporteerd. Deze export betekent een zeer grote hoeveelheid gegevens.
 - "Per day per valve" (Per dag per klep): De gehele voerhoeveelheid per dag en klep wordt in de geselecteerde periode geëxporteerd. Deze export betekent een middelgrote hoeveelheid gegevens.
 - "Per chosen interval per valve" (Per gekozen interval per klep): Per klep wordt de gehele voerhoeveelheid, die in de geselecteerde periode is gedoseerd, vermeld. Bij deze export wordt per klep slechts één waarde afgegeven.
- Voer een bestandsnaam in voor de te exporteren Excel-tabel.
 - Selecteer de opslaglocatie en klik op "Opslaan".

5 Stamgegevens

Als stamgegevens wordt informatie gedefinieerd, die u in principe slechts eenmalig aanmaakt en gedurende een lange periode geldig blijft. Stamgegevens kunt u meerdere keren via verschillende functies verwerken, bijv. componenten in voercurves of de vermelding van leveranciers bij het stallen.

Stamgegevens vraagt u in het menu via "Configuratie" > "Algemeen" op.



Voor het aanmaken van recepten, componenten en additieven, zie hoofdstuk:

- [ExternalLink:](#)
- [ExternalLink:](#)
- 2.3 "Recept aanmaken"

Als voorbeeld worden hieronder de stamgegevens voor medicijnen, rassen en leveranciers aangemaakt. De procedure is voor de overige stamgegevens gelijk.

LET OP!

Vetgedrukte velden zijn verplichte velden.

5.1 Ras aanmaken


1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Ras".

2. Klik in het dialoogvenster "Ras" op "Toevoegen".

In het dialoogvenster "Ras" worden alle aangemaakte rassen vermeld, die u achteraf kunt bewerken, kopiëren of wissen.

3. Vul de gegevens voor het ras in.

4. Als u een lijn wilt aanmaken, klikt u op "Toevoegen" en schrijft u een beschrijving in het gemarkeerde bereik.



5. Bevestig de invoer door te klikken op "OK".

5.2 Leveranciers toevoegen

1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Leverancier".

2. Klik in het dialoogvenster "Leverancier" op "Toevoegen".

In het dialoogvenster "Leverancier" worden alle aangemaakte leveranciers vermeld, die u achteraf kunt bewerken, kopiëren of wissen.

3. Vul de gegevens voor de leverancier in.

Leverancier

Code	East		
Naam	East Pig		
Contactpersoon			
Adres			
Straat	One North Capitol, Suite 100		
Postcode / postbus			
Postcode / plaats		Indianapolis	
Regio	IN 46204-2288		
Land	USA		
Communicatie			
Telefoonnr.	930-437-8704		
Mobielnr.			
Faxnr.	930-437-8703		
E-Mail	EAST-PIG@WEBNEW.US		
Website			
Ons klantnr.	4456		

✓

OK

✕

Annuleren

4. Bevestig de invoer door te klikken op "OK".

5.3 Instellingen voor levering en verbruik

Elke levering en elk verbruik van een silo wordt in het silobeheer geregistreerd en is in te zien. Na een lange periode verzamelt zich een grote hoeveelheid gegevens in het weergavevenster. Deze hoeveelheid gegevens kunt u als volgt beheren:

1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Silobeheer"

2. Voer het gewenste aantal dagen in voor de betreffende instellingen.



3. Klik vervolgens op "OK" om de instellingen over te nemen.

5.4 Voederfase aanmaken


U kunt voederfasen toewijzen de afzonderlijke curvedagen van een voercurve. Voederfasen maken het automatisch verwisselen op meer of minder voedertijden mogelijk.

Bij elke voederfase slaat u een voertaak op. Voertaken worden in het taakbeheer  gedefinieerd.

1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Voederfasen".
2. Klik in het dialoogvenster "Voederfasen" op "Toevoegen".

In het dialoogvenster "Voederfasen" worden alle aangemaakte voederfasen vermeld, die u achteraf kunt bewerken, kopiëren of wissen.

3. Geef de voederfase een afkorting en indien nodig een beschrijving in het invoerveld "Naam".



4. Klik vervolgens op "OK" om de instellingen over te nemen.

5.5 Vreettijdtabel aanmaken

Vreettijdtabellen worden bij een (ad-libidum) sensorvoeding gebruikt. De sensor meet of de trog leeg is gevreten of niet en geeft deze informatie door aan de BigFarmNet-manager. Aan de hand van deze informatie kunt u zien op welke tijdstippen de trog is leeggevreten en wanneer niet. Via een tabel vreettijd kunt u dan voor de overeenkomstige vreettijden een voeraanpassing uitvoeren. Vreettijdtabellen worden bij de definitie van een voercurve voor de brijvoeding als optie geselecteerd, zie hoofdstuk "Voercurve voor vloeibaar voeren definiëren", pagina 19.

1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Vreettijdtabellen".
2. Klik in het dialoogvenster "Vreettijdtabellen" op "Toevoegen".

In het dialoogvenster "Vreettijdtabellen" wordt alle aangemaakte vreettijdtabellen vermeld, die u achteraf kunt bewerken, kopiëren of wissen.

3. Geef de vreettijdtabel een naam.

Gegevens voor "Beschrijving" en "Niet leeg door vulhoeveelheid" zijn optioneel.

Vreettijdtabel

Naam:

Beschrijving:

Niet leeg door vulhoeveelheid:

Voeraanpassing / vreettijd

Tijd van	Tijd tot	Status	Aanpassing (%)
0 min	5 min	OK	20%
5 min	9 min	OK	10%
9 min	13 min	OK	0%
13 min	17 min	Acceptabel	-10%
17 min	20 min	Niet-OK	-20%

+ Bereik delen - Verwijder bereik

☐ Reset aanpassing naar 100 % als trog niet leeg was op de voertijd ar.

☐ Reset aanpassing naar 100 % voor de eerste voerronde op elke dag

☒ Nieuwe absolute aanpassingswaarde na elke voerronde

☐ Berekende aanpassingswaarde gebaseerd op eerdere waarde

OK Annuleren

4. Breng de gewenste aanpassing van de vreettijden en de hoeveelheid aan. De vooraf ingestelde waarden dienen daarbij als richtlijn.
 - a) Klik de periode aan, die u wilt bewerken.

- b) Als u de periode wilt opdelen, klikt u op de knop "Bereik delen".

OF:

Als u de periode wilt verwijderen, klikt u op de knop "Verwijder bereik".

- c) Wijzig de waarde van de periode en de procentuele hoeveelheid via de pijl omhoog en omlaag naast het invoerveld.

OF:

Klik in het invoerveld en voer de gewenste waarde direct in.

- d) Klik in het invoerveld onder de kolom "Status" en selecteer de status voor deze periode.

B

Behandelingenboek 54

C

Componenten 3

D

Dierbewegingen 55

E

Enting 48

Entstof 62

F

Filters 33

Fokbeheer 32

Fokker 62

G

Gegevens wijzigen 37

Gegevensexport 60

I

Ingekomen 26

K

Kolommen 36

L

Leverancier 63

Levering 64

M

Medicijn toedienen 48

Medische behandeling 48

P

Populatieboek 37

R

Ras 63

Recepten 7

S

Selectie opslaan 35

Snelfilter 34

Stamgegevens 62

Systeembeperkingen 1

Systeembeschrijving 1

T

Trogbewaking 59

V

Veearts 62

Verbruik 64

Verplaatsen 31

Verwijderd 30

Voederfase 65

Voedingsstof 2

Voerboek 53

Voercurve 2

Voermix 7

Voormengrecept 10

Vreettijdtabel 66